

# Select<sup>®</sup>

PEEL HERE  
TO OPEN

USE WITH AMIGO<sup>®</sup> ADJUVANT

**EMULSIFIABLE CONCENTRATE  
POST-EMERGENCE HERBICIDE**

**GROUP 1 HERBICIDE**

**CONTAINS CLETHODIM**

POST-EMERGENCE HERBICIDE FOR CONTROL OF GRASSES IN SEEDLING ALFALFA, LEGUME VEGETABLES (SUCCULENT OR DRIED) AND EDAMAME, Highbush BLUEBERRY, CANOLA, BASIL, CORIANDER, DILL, CARAWAY, FENUGREEK, CRANBERRY, FLAX (including low linolenic acid varieties), ORIENTAL (BROWN) MUSTARD (condiment and oilseed types), *BRASSICA CARINATA*, YELLOW MUSTARD, DRY BULB ONIONS, DRY BULB SHALLOTS AND GARLIC, POTATOES, PRAIRIE CARNATION, SAFFLOWER, SOYBEANS, SPINACH, and SUNFLOWERS RED GARDEN (TABLE) BEET, PARSNIP, CARROT, RADISH, CHERRY (tart and sweet), CERTAIN HERBS, SPICES and HOPS.

**AGRICULTURAL**

**GUARANTEE: CLETHODIM . . . . .240 g/L**

REGISTRATION NO. 22625  
PEST CONTROL PRODUCTS ACT

**WARNING: EYE AND SKIN IRRITANT  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
READ THE LABEL AND BOOKLET BEFORE USING**

FOR 24-HOUR MEDICAL EMERGENCY ASSISTANCE CALL PROPHARMA: 1-866-303-6952 or +1-651-603-3432.

FOR 24-HOUR CHEMICAL EMERGENCY (spill, leaks, fire, exposure, or accident) CALL CHEMTREC:  
1-800-424-9300 or +1-703-527-3887.

For Product Use Information Call 1-866-761-9397

ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA, LLC  
15401 Weston Parkway, Suite 150  
Cary, NC 27513  
United States

032218V002  
102759-D(0918)

**NET CONTENTS: 3 LITRES**

 **Arysta**  
LifeScience

## GENERAL INFORMATION:

**SELECT**<sup>®</sup> is a selective post-emergence herbicide for control of a broad range of grasses in seedling alfalfa, legume vegetables (succulent or dried) and edamame, highbush blueberry, canola, basil, coriander, dill, caraway, fenugreek, cranberry, flax (including low linolenic acid varieties), oriental (brown) mustard (condiment and oilseed types), *Brassica carinata*, safflower, yellow mustard, dry bulb onions, dry bulb shallots and garlic, potatoes, Prairie Carnation, soybeans, spinach, sunflowers, red garden (table) beet, parsnip, carrot, radish, cherry (tart and sweet), certain herbs, spices and hops.

**SELECT is to be used only with the adjuvant AMIGO**<sup>®</sup>.

**SELECT** is a systemic herbicide which is translocated from the treated foliage to the growing points of the leaves, shoots and roots. Uptake into the plant is primarily through its leaves. Thorough coverage of the foliage is important for consistent grass control. Susceptible grasses that are actively growing will undergo a burn-back and colour change after treatment. Leaf foliage will first change from green to yellowish, then purplish and finally brown colour. The time required for complete control is normally 7 to 21 days following treatment, depending on growing conditions and crop competition.

## PRECAUTIONS:

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. CAUSES EYE AND SKIN IRRITATION.** Avoid contact with skin, eyes and clothing. Wash concentrate from skin or eyes immediately. Do not inhale fumes. Avoid breathing vapours or spray mist. After use, wash hands and other exposed skin. When using, do not eat, drink or smoke. Remove and launder contaminated clothing separately from household laundry before reuse. Store the container tightly closed and away from seeds, feeds, fertilizer, plants and foodstuffs. Observe appropriate provincial buffer zones around bodies of water and wetland areas. When handling the concentrate, mixing, loading or during cleanup and repair activities, wear goggles or face shield, rubber apron, chemically resistant gloves, rubber boots, long sleeved shirt and long-legged pants. During application, wear long sleeved shirt, long legged pants and chemical-resistant gloves. Chemical resistant gloves are not required to be worn during groundboom or aerial application.

Application is limited to agricultural crops only when there is low risk to drift to areas of human habitation or activity such as houses, cottages, schools and recreation areas, taking into consideration wind speed, wind direction, temperature inversions, application equipment and sprayer settings.

**DO NOT enter or allow worker entry into treated areas during the restricted entry interval (REI) of 12 hours.**

### ENVIRONMENTAL HAZARDS:

**TOXIC** to non-target terrestrial plants. Observe buffer zones specific under DIRECTIONS FOR USE.

Avoid spray drift. Avoid contamination of ponds, streams, rivers and desirable vegetation.

This product contains a petroleum distillate which is moderately to highly toxic to aquatic organisms. Avoid contamination of aquatic systems during application. Do not contaminate these systems through direct application, disposal of waste or cleaning of equipment.

**FIRST AID:**

**If swallowed:** Call a poison control centre or doctor immediately for treatment advice. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control centre or doctor. Do **not** give any liquid to the person. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

**If on skin or clothing:** Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15-20 minutes. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

**If in eyes:** Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye. Call a poison control centre or doctor for treatment advice.

**If inhaled:** Move person to fresh air. If person is not breathing, call 911 or an ambulance, then give artificial respiration, preferably by mouth-to-mouth, if possible. Call a poison control centre or doctor for further treatment advice.

Take container, label or product name and Pest Control Product Registration Number with you when seeking medical attention.

**TOXICOLOGICAL INFORMATION:** Treat symptomatically. This product contains petroleum distillates. Vomiting may cause aspiration pneumonia. Danger from lung aspiration of petroleum based solvents must be weighed against toxicity when considering emptying stomach.

**STORAGE AND DISPOSAL****STORAGE:**

May be stored at any temperature. **SHAKE WELL BEFORE USING.** Insecticides and fungicides should be segregated from herbicides so as to prevent the possibility of cross-contamination.

**DISPOSAL:**

**RECYCLABLE CONTAINER DISPOSAL:** Do not reuse this container for any purpose. This is a recyclable container, and is to be disposed of at a container collection site. Contact your local distributor/dealer or municipality for the location of the nearest collection site. Before taking the container to the collection site:

1. Triple- or pressure-rinse the empty container. Add the rinsings to the spray mixture in the tank.
2. Make the empty, rinsed container unsuitable for further use.

If there is no container collection site in your area, dispose of the container in accordance with provincial requirements.

**DISPOSAL OF UNUSED, UNWANTED PRODUCT:** For information on disposal of unused, unwanted product, contact the manufacturer or the provincial regulatory agency. Contact the manufacturer and the provincial regulatory agency in case of a spill, and for clean-up of spills.

**DIRECTIONS FOR USE:**

As this product is not registered for the control of pests in aquatic systems, DO NOT use to control aquatic pests.

DO NOT contaminate irrigation or drinking water supplies or aquatic habitats by cleaning of equipment or disposal of wastes.

**TIME OF APPLICATION:**

Apply **SELECT** when the annual grasses and volunteer cereals are in the 2- to 6-leaf stage as specified under Application Rates of **SELECT**. Most effective control is achieved when application is made prior to tillering when annual grasses are small and actively growing.

For suppression or control of quackgrass, apply **SELECT** when the quackgrass is in the 2- to 6-leaf stage and 6 to 15 cm in height. Most effective results are achieved when application is made at the 3- to 5-leaf stage, when the canopy is uniform and actively growing.

**SELECT** will be less effective when plants are stressed by lack of moisture, excessive moisture, low-temperature and/or very low relative humidity. Regrowth by tillering may occur if application is made under any of the above stress conditions. In wide row crops, where the canopy may be slow to close, cultivation may be necessary to control grasses that emerge after treatment.

For chickpeas, apply **SELECT** at a maximum of one application per season before the crop reaches the 9 node stage (18 cm height maximum) and when the annual grasses and volunteer cereals are in the 2- to 6-leaf stage.

For dill and fenugreek, apply **SELECT** post-emergence, when dill or fenugreek is in the 3- to 5-leaf stage at a maximum of one application per season.

For Prairie Carnation, apply **SELECT** post-emergence, when Prairie Carnation is in the 2- to 5-leaf stage. A maximum of one application may be made per year.

For safflower, apply **SELECT** post-emergence, when safflower is in the 6- to 8-leaf stage at a maximum of one application per season.

Cranberry is tolerant to **SELECT** at all stages of growth, however, do not apply **SELECT** between the hook stage and full fruit set.

For dry bulb onions, dry bulb shallots and garlic, apply **SELECT** post-emergence, when crops are in the 1- to 4-leaf stage.

Apply **SELECT** only to established sweet and tart cherry trees. The pre-harvest interval outlined in the Crop Recommendations table must be followed to avoid excessive crop residues.

All other labelled crops are tolerant to **SELECT** at all stages of growth. However, the pre-harvest interval outlined in the Crop Recommendations table must be followed to avoid excessive crop residues.

**APPLICATION RATES OF SELECT:**

Rates of use are given below to control various grass species. Refer to crop section for the maximum use rate on each crop.

Grass Species	Leaf Stage	Application Rate of SELECT	Application Rate of AMIGO Adjuvant
*Foxtail (green, yellow) Wild oats Volunteer cereals (wheat, barley, oats)	2 to 4	0.125 L/ha	0.5 % v/v

**APPLICATION RATES OF SELECT:** *(continued)*

Grass Species	Leaf Stage	Application Rate of SELECT	Application Rate of AMIGO Adjuvant
Barnyard Grass Witchgrass Fall panicum Proso millet Volunteer Corn Volunteer canary grass	2 to 6	0.125 L/ha	0.5 % v/v
Wild Oats Volunteer cereals (wheat, barley, oats) Foxtail (green, yellow) Persian darnel Crabgrass (smooth and large) Proso millet Witchgrass Fall panicum Barnyard grass Volunteer corn Volunteer canary grass Quackgrass suppression	2 to 6	0.19 L/ha	0.5 % v/v
Quackgrass control**	2 to 6	0.38 L/ha	1.0 % v/v
Annual bluegrass suppression	2 to 6	0.38 L/ha	0.5 % v/v

\***SELECT** applied at 0.125 L/ha for the control of weeds listed in this section of the table should only be applied under the following conditions:

- Good crop stand
- Early application (as in above table, prior to tillering)
- Do not tank-mix with other pesticides
- Do not apply to volunteer winter cereals
- Light to moderate weed infestation

- Adequate moisture and fertility
- Absence of stress, good growing conditions

If any one of the above conditions are not present at the time of application, use 0.19 L/ha rate of **SELECT**.

\*\* For adequate control of quackgrass, use a minimum spray volume of 100L / ha.

#### CROP RECOMMENDATIONS:

Crops	Maximum Application Rate of SELECT	Application Method <sup>6</sup>	Pre-Harvest Interval
Seedling Alfalfa	0.38 L/ha	Ground application only	30 days
Pigeon Pea <sup>1,2</sup>	0.19 L/ha	Ground and aerial application	75 days
<b>Edamame and Edible-podded legume vegetables (Crop subgroup 6A):</b> Bean ( <i>Phaseolus</i> spp.) (includes runner bean, snap bean, wax bean), Bean ( <i>Vigna</i> spp.) (includes asparagus bean, Chinese longbean, moth bean, yardlong bean), Jackbean ( <i>Canavalia ensiformis</i> ), Pea ( <i>Pisum</i> spp.) (includes dwarf pea, edible-pod pea, snow pea, sugar snap pea), Pigeon pea ( <i>Cajanus cajan</i> ), Soybean (immature seed) ( <i>Glycine max</i> ), Sword bean ( <i>Canavalia gladiata</i> ). <sup>1,2,5</sup>	0.19 L/ha	Ground application only	21 days
<b>Succulent shelled pea and bean (Crop subgroup 6B):</b> Bean ( <i>Phaseolus</i> spp.) (includes lima bean, green bean), Bean ( <i>Vigna</i> spp.) (includes blackeyed pea, cowpea, southern pea), Broad bean (fava bean) ( <i>Vicia faba</i> ), Pea ( <i>Pisum</i> spp.) (includes English pea, garden pea, green pea), Pigeon pea ( <i>Cajanus cajan</i> ). <sup>1,2,5</sup>			
<b>Dried Shelled Pea and Bean (Crop subgroup 6C) (except soybean, field pea, lentils, pigeon pea) including:</b> Bean ( <i>Lupinus</i> spp.) (includes grain lupin, sweet lupin, white lupin and white sweet lupin); bean ( <i>Phaseolus</i> spp.) (includes field bean, kidney bean, lima bean (dry), navy bean, pinto bean, tepary bean); bean ( <i>vigna</i> spp.) (includes adzuki bean, blackeyed pea, catjang, cowpea, crowder pea, moth bean, mung bean, rice bean, southern pea, urd bean); broad bean (fava bean) ( <i>Vicia faba</i> ); chickpea (garbanzo bean) ( <i>Cicer arietinum</i> ); guar ( <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> ); lablab bean (hyacinth bean) ( <i>Lablab purpureus</i> ); <sup>1,2</sup>	0.19 L/ha	Ground and aerial application	60 days

**CROP RECOMMENDATIONS:** *(continued)*

Crops	Maximum Application Rate of SELECT	Application Method <sup>6</sup>	Pre-Harvest Interval
Caraway, Coriander (cilantro) <sup>1,5</sup>	0.38 L/ha	Ground application only	60 days for seed 30 days for leaves
Angelica; balm (lemon balm); basil; borage; burnet; chamomile; catnip; chervil; clary; costmary; culantro (leaf); horehound; hyssop; lavender; lovage; marigold; marjoram (includes sweet or annual marjoram, wild marjoram or oregano and pot marjoram); nasturtium; parsley (dried); pennyroyal; rosemary; rue; sage; summer and winter savory; sweet bay (bay leaf); tansy; tarragon; thyme; wintergreen; woodruff; and wormwood <sup>1,2,4,5</sup>	0.19 L/ha	Ground application only	30 days
Anise (anise seed); caraway (black); celery seed; culantro (seed); cumin; fennel [common and Florence (seed)]; juniper berry; lovage (seed); mustard (seed); poppy (seed); and Saffron. <sup>1,2,4,5</sup>	0.19 L/ha	Ground application only	60 days
Cherry (sweet and tart) <sup>1,5,8</sup> (established trees)	0.38 L/ha	Ground application only	14 days
Highbush Blueberry <sup>1,4,5</sup>	0.38 L/ha	Ground application only	14 days
Canola	0.38 L/ha	Ground and aerial application	60 days
Red garden (table) beet, Parsnip, Carrot, Radish <sup>3,5</sup>	0.38 L/ha	Ground application only	30 days
Cranberry <sup>1,2,5</sup>	0.38 L/ha	Ground application only	30 days
Chive <sup>1,5</sup>	0.38 L/ha	Ground application only	30 days

**CROP RECOMMENDATIONS:** (continued)

Crops	Maximum Application Rate of SELECT	Application Method <sup>6</sup>	Pre-Harvest Interval
Dill <sup>1,5</sup>	0.38 L/ha	Ground application only	30 days (dillweed leaves) 40 days (dill seed)
Flax (including low linolenic acid varieties)	0.38 L/ha	Ground and aerial application	60 days
Fenugreek <sup>1,3,5</sup>	0.38 L/ha	Ground application only	30 days (leaf and seed)
Field Peas	0.38 L/ha	Ground and aerial application	75 days
Hops <sup>1,4,5</sup>	0.38 L/ha	Ground application only	21 days
Lentils	0.38 L/ha	Ground and aerial application	60 days
Oriental (Brown) Mustard (condiment and oilseed types)	0.38 L/ha	Ground and aerial application	60 days
Yellow Mustard	0.38 L/ha	Ground and aerial application	60 days
<i>Brassica carinata</i>	0.38 L/ha	Ground and aerial application	60 days
Dry Bulb Onions, Dry Bulb Shallot and Garlic <sup>1,5</sup>	0.38 L/ha	Ground application only	45 days
Potatoes	0.38 L/ha	Ground and aerial application	60 days
Prairie Carnation <sup>1,5,6</sup>	0.19 L/ha	Ground application only	N/A
Safflower <sup>1,5</sup>	0.38 L/ha	Ground application only	70 days
Soybeans	0.38 L/ha	Ground and aerial application	75 days
Spinach <sup>3,5</sup>	0.19 L/ha	Ground application only	14 days
Sunflowers	0.38 L/ha	Ground and aerial application	72 days

1. Apply a maximum of one application per year.

2. NOTE: Varieties of this crop or crops in this crop group may vary in their tolerance to herbicides, including SELECT. Since not all crops or crop varieties have been tested for tolerance to SELECT, first use of SELECT should be limited to a small area of each crop or variety to confirm tolerance prior to adoption as a general field practice. Additionally, consult your supplier for information on the tolerance of specific varieties to SELECT.



3. Apply a maximum of two applications per year. If repeat application is required, allow at least 14 days between first and second application.
4. Apply SELECT as a broadcast spray directed to the ground.
5. Refer to section "MINOR USES" in this label for additional use instructions.
6. Do not harvest treated Prairie Carnation for human consumption.
7. SPRAY VOLUME FOR AERIAL APPLICATION: Apply in 28 to 55 L/ha. Increase spray volumes up to 100L/ha as grass or crop foliage becomes dense.
8. Do not apply SELECT directly over the top of the sweet and tart cherry trees. Direct the spray at the base of the tree where grassy weeds are growing. If SELECT is improperly applied, crop injury can occur.

#### **TANK-MIXES:**

When applied as a tank-mix combination, read and observe all label directions, including rates, restrictions, and grazing limitations for each product used in the tank-mix. Follow the more stringent label precautionary measures for mixing, loading and applying stated on both product labels.

#### **SELECT AND BUCTRIL® M:**

**Flax (including low linolenic acid varieties):** SELECT may be tank-mixed with BUCTRIL M for control of certain broadleaf and grassy weeds in flax (including low linolenic acid varieties) in one spray operation. Apply in 55 to 110 litres of water per hectare at a pressure of 275 kPa. DO NOT spray this tank-mix on plants under stress. DO NOT spray during periods of hot, humid weather. Follow all precautions, limitations and timing recommendations on the BUCTRIL M label.

**Time of Application:** Flax (including low linolenic acid varieties) may be treated from 5 cm high to the early bud stage. For best results, apply when flax (including low linolenic acid varieties) is 5 to 10 cm high and weeds are in the seedling stage. If broadleaf weeds and grassy weeds are not in the recommended treatment stage at the same time, then separate applications should be made.

**Application Rate:** SELECT at 0.19 to 0.38 L/ha tank-mixed with BUCTRIL M at 1.0 L/ha and adjuvant AMIGO at 0.5 to 1.0 % v/v.

**Weeds Controlled:** As listed for SELECT used alone, plus certain seedling broadleaf weeds. Refer to the BUCTRIL M label for the broadleaf weeds controlled.

#### **MIXING INSTRUCTIONS:**

1. Thoroughly clean the sprayer by flushing the system with water containing detergent.
2. Fill clean spray tank half full with clean water. Start agitation system.
3. If tank-mixing SELECT and BUCTRIL M for once-over grass and broadleaf weed control in flax (including low linolenic acid-varieties), add the correct amount of BUCTRIL M. Continue to agitate.
4. Add the correct amount of SELECT. Continue to agitate.
5. Add the correct amount of adjuvant AMIGO along with the remaining amount of water necessary to fill the spray tank.
6. Continue to agitate or run the by-pass system.
7. After any break in the spraying operation, agitate thoroughly before spraying again. Check inside the tank to ensure that sprayer agitation is sufficient to re-mix the spray materials. Do not allow the mixture to sit overnight.
8. Immediately after use, thoroughly clean the sprayer by flushing the system with clean water containing detergent.

*For disposal of cleaning solution, see section on DISPOSAL.*

#### **SELECT AND CURTAIL® M:**

**Flax (including low linolenic acid varieties):** **SELECT** may be tank-mixed with CURTAIL M for control of certain broadleaf and grass weeds in flax in one spray operation. Apply in a minimum of 100 L/ha spray volume at a pressure of 275 kPa.

Follow all precautions, limitations, restrictions and timing recommendations on the CURTAIL M label.

**Time of Application:** Flax may be treated from 5 to 15 cm in height. Apply when the grassy weeds are in the 2- to 6-leaf stage and the broadleaf weeds are actively growing. Application to Canada thistle should be made when Canada thistle is between 10 cm and up to the pre-bud stage. If broadleaf weeds and grass weeds are not in recommended treatment stage at the same time, then separate applications should be made.

**Application Rate:** **SELECT** at 0.19 L/ha tank-mixed with CURTAIL M at 1.5 to 2.0 L/ha and with the adjuvant AMIGO at 0.5 % v/v.

**Weeds Controlled:** Weed claims listed on the **SELECT** Herbicide label plus weed claims listed on Curtail M label. Refer to the CURTAIL M label for the broadleaf weeds controlled.

#### **Grazing Interval**

Do not cut treated crops for feed or graze until 60 days after application.

#### **MIXING INSTRUCTIONS:**

1. Thoroughly clean the sprayer by flushing the system with water containing detergent.
2. Fill clean spray tank half full with clean water. Start agitation system.
3. Add the required amount of CURTAIL M to the tank. Continue to agitate.
4. Add the correct amount of **SELECT**. Continue to agitate.
5. Add the correct amount of adjuvant AMIGO along with the remaining amount of water necessary to fill the spray tank.
6. Continue to agitate or run the by-pass system.
7. After any break in the spraying operation, agitate thoroughly before spraying again. Check inside the tank to ensure that sprayer agitation is sufficient to re-mix the spray materials. Do not allow the mixture to sit overnight. In the case of tank mixtures with broadleaf herbicides, settling will occur if agitation is not continuous.
8. If an oil film starts to build up in the tank, drain it and clean tank with strong detergent solution.
9. Immediately after use, thoroughly clean the sprayer by flushing the system with clean water containing detergent.

#### **SELECT AND MCPA ESTER:**

**Flax:** **SELECT** may be tank-mixed with MCPA ESTER for control of certain broadleaf and grassy weeds in flax in one spray operation. For ground applications, apply in a minimum of 100 L/ha spray volume at a pressure of 275 kPa. For aerial application apply this tank-mix in a minimum of 30 L/ha spray volume at a pressure of 235 kPa.

#### **NOTE: THIS TANK-MIX MAY NOT BE APPLIED TO LOW LINOLENIC ACID VARIETIES OF FLAX.**

**Time of application:** Flax may be treated from 5 cm tall to just before the bud stage. Do not apply after the early bud stage. Apply when the grassy weeds are in the 2- to 6-leaf stage and broad leaf weeds are in the seedling stage and actively growing. If broadleaf weeds and grassy weeds are not in the recommended treatment stage at the same time, then separate applications should be made.

**Application Rate:** **SELECT** at 0.19 to 0.38 L/ha tank-mixed with MCPA ESTER and the adjuvant AMIGO at 0.5 to 1.0 % v/v.

**Weeds Controlled:** As listed for **SELECT** used alone, plus certain seedling broadleaf weeds. Refer to the MCPA ESTER label for the rates and broadleaf weeds controlled and specific information on flax.

**MIXING INSTRUCTIONS:**

1. Thoroughly clean the sprayer by flushing the system with water containing detergent.
2. Fill clean spray tank half full with clean water. Start agitation system.
3. Add the correct amount of MCPA ESTER. Continue to agitate.
4. Add the correct amount of **SELECT**. Continue to agitate.
5. Add the correct amount of adjuvant AMIGO along with the remaining amount of water necessary to fill the spray tank.
6. Continue to agitate or run the by-pass system.
7. After any break in the spraying operation, agitate thoroughly before spraying again. Check inside the tank to ensure that sprayer agitation is sufficient to re-mix the spray materials. Do not allow the mixture to sit overnight.
8. Immediately after use, thoroughly clean the sprayer by flushing the system with clean water containing detergent.

**SELECT AND LONTREL® 360:**

**Flax (including low linolenic acid varieties):** **SELECT** may be tank-mixed with LONTREL 360 for control of certain broadleaf and grass weeds in flax in one spray operation. Apply in a minimum of 100 L/ha spray volume at a pressure of 275 kPa.

Follow all precautions, limitations and timing recommendations on the LONTREL 360 label.

**Time of Application:** Flax may be treated from 5 to 10 cm in height. Apply when the grassy weeds are in the 2- to 6-leaf stage and the broadleaf weeds are actively growing. Application to Canada thistle should be made when Canada thistle is in the rosette to pre-bud stage of growth. If broadleaf weeds and grass weeds are not in recommended treatment stage at the same time, then separate applications should be made.

**Application Rate:** **SELECT** at 0.19 L/ha tank-mixed with LONTREL 360 at 0.56 to 0.83 L/ha and with the adjuvant AMIGO at 0.5 % v/v.

**Weeds Controlled:** Wild oats, green foxtail, volunteer barley, volunteer wheat, volunteer oats, wild buckwheat.

Canada thistle	0.56 L LONTREL 360/ha	Season-long control
	0.83 L LONTREL 360/ha	Control extended into following year.

**MIXING INSTRUCTIONS:** For mixing instructions, refer to **SELECT** and LONTREL 360 tank-mix on canola.

**Canola:** **SELECT** may be tank-mixed with LONTREL 360 for control of certain broadleaf and grass weeds in canola in one spray operation. Apply in a minimum of 100 L/ha spray volume at a pressure of 275 kPa. Follow all precautions, limitations and timing recommendations on the LONTREL 360 label.

**Time of Application:** Canola may be treated from the 2- to 6-leaf stage. Apply when the grassy weeds are in the 2- to 6-leaf stage and the broadleaf weeds are actively growing. Application to Canada thistle should be made when Canada thistle is in the rosette to pre-bud stage of growth. If broadleaf weeds and grass weeds are not in recommended treatment stage at the same time, then separate applications should be made.

**Application Rate:** SELECT at 0.19 L/ha tank-mixed with LONTREL 360 at 0.42 to 0.83 L/ha and with the adjuvant AMIGO at 0.5 % v/v.

**Weeds Controlled:** Wild oats, green foxtail, volunteer barley, volunteer wheat, volunteer oats.

Wild Buckwheat	0.56 L LONTREL 360/ha	Season-long control
Canada thistle	0.42 L LONTREL 360/ha	Top growth control to 6 to 8 weeks
	0.56 L LONTREL 360/ha	Season-long control
	0.83 L LONTREL 360/ha	Control into following year.

#### **MIXING INSTRUCTIONS:**

1. Thoroughly clean the sprayer by flushing the system with water containing detergent.
2. Fill clean spray tank half full with clean water. Start agitation system.
3. Add the required amount of LONTREL 360 to the tank. Continue to agitate.
4. Add the correct amount of SELECT. Continue to agitate.
5. Add the correct amount of adjuvant AMIGO along with the remaining amount of water necessary to fill the spray tank.
6. Continue to agitate or run the by-pass system.
7. After any break in the spraying operation, agitate thoroughly before spraying again. Check inside the tank to ensure that sprayer agitation is sufficient to remix the spray materials. Do not allow the mixture to sit overnight. In the case of tank mixtures with broadleaf herbicides, settling will occur if agitation is not continuous.
8. If an oil film starts to build up in the tank, drain it and clean tank with strong detergent solution.
9. Immediately after use, thoroughly clean the sprayer by flushing the system with clean water containing detergent.

#### **SELECT AND PURSUIT®:**

**Field Peas:** SELECT may be tank-mixed with PURSUIT for control of certain broadleaf and grassy weeds in field peas in one spray operation. Apply in a minimum of 100 litres of water per hectare at a spray pressure of 275 kPa. Follow all precautions, limitations and timing recommendations on the PURSUIT label.

**Time of Application:** Field peas may be treated up to the sixth (6<sup>th</sup>) trifoliolate leaf stage. Apply when volunteer wheat, volunteer barley, wild oats and green foxtail are in the 2- to 6-leaf stage. Apply up to the 4-leaf stage for control of broadleaf weeds. If broadleaf weeds and grassy weeds are not in the recommended treatment stage at the same time, then separate applications should be made.

**Application Rate:** SELECT at 0.19 L/ha tank-mixed with PURSUIT at 210 mL/ha and the adjuvant AMIGO at 0.5 % v/v.

**Weeds Controlled:** Wild oats, green foxtail, volunteer barley, volunteer wheat plus the weeds as listed on the PURSUIT label.

#### **MIXING INSTRUCTIONS:**

1. Thoroughly clean the sprayer by flushing the system with water containing detergent.
2. Fill clean spray tank half full with clean water. Start agitation system.
3. If tank-mixing SELECT and PURSUIT for once over grass and broadleaf weed control in field peas, add the correct amount of PURSUIT. Continue to agitate.

4. Add the required amount of SELECT to the tank. Continue to agitate.
5. Add the correct amount of adjuvant AMIGO along with the remaining amount of water necessary to fill the spray tank.
6. Continue to agitate or run the by-pass system.
7. After any break in the spraying operation, agitate thoroughly before spraying again. Check inside the tank to ensure that sprayer agitation is sufficient to re-mix the spray materials. Do not allow the mixture to sit overnight.
8. Immediately after use, thoroughly clean the sprayer by flushing the system with clean water containing detergent.

**Imazethapyr Tolerant Canola (e.g. canola varieties with the SMART trait):**

**SELECT** may be tank-mixed with PURSUIT for control of certain broadleaf and grassy weeds in imazethapyr-tolerant canola varieties in one spray operation. Apply in a minimum of 100 litres of water per hectare at a spray pressure of 275 kPa. Follow all precautions, limitations and timing recommendations on the PURSUIT label.

**Time of Application:** Imazethapyr-tolerant canola varieties may be treated after the crop has developed one (1) fully expanded leaf. Apply when grassy weeds are in the 2- to 6-leaf stage. Apply up to the 4-leaf stage for control of broadleaf weeds.

**Application Rate:** **SELECT** at 0.19 L/ha tank-mixed with PURSUIT at 0.105 or 0.21 L/ha and the adjuvant AMIGO at 0.5 % v/v.

**Weeds Controlled:** As listed for **SELECT** plus the following additional weeds.

PURSUIT at 0.105 L/ha for control of chickweed, hempnettle, redroot pigweed\*, stinkweed, volunteer canola (not imazethapyr-tolerant), wild mustard and wild buckwheat\*, in the 1- to 4-leaf stage.

\*For the control of light infestations only. For heavy infestations, use the 0.21 L/ha rate of PURSUIT.

PURSUIT at 0.21 L/ha for control of weeds as listed on the PURSUIT label.

**MIXING INSTRUCTIONS:** For mixing instructions, refer to **SELECT** and PURSUIT tank-mix on field peas.

**SELECT AND MUSTER®:**

**Canola:** **SELECT** may be tank-mixed with MUSTER for control of certain broadleaf and grassy weeds in canola in one spray operation. Apply in a minimum of 100 litres of water per hectare at a spray pressure of 275 kPa. Follow all precautions, limitations and timing recommendations on the MUSTER label.

**Time of Application:** Canola may be treated from the 2-leaf stage to the beginning of bolting. Apply when the grassy weeds are in the 2- to 6-leaf stage and when the broadleaf weeds are in the cotyledon to 6-leaf stage. If broadleaf weeds and grassy weeds are not in the recommended treatment stage at the same time, then separate applications should be made.

**Application Rate:** **SELECT** at 0.19 L/ha tank-mixed with MUSTER at 20 or 30 g/ha and the adjuvant AMIGO at 0.5 % v/v.

**Weeds Controlled:**

**MUSTER at 20 or 30 g/ha:** Wild oats, green foxtail, volunteer barley, volunteer oats, volunteer wheat, hempnettle, wild mustard, green smartweed, flixweed (spring seedlings), stinkweed\*, and redroot pigweed.

\* *Stinkweed suppression at the lower rate. Apply to stinkweed in the 1- to 4-leaf stage.*

### **MIXING INSTRUCTIONS:**

1. Thoroughly clean the sprayer by flushing the system with water containing detergent.
2. Fill clean spray tank half full with clean water. Start agitation system.
3. Add the required amount of MUSTER to the tank. Continue to agitate.
4. Once MUSTER is in suspension, add the required amount of SELECT. Continue to agitate.
5. Add the correct amount of adjuvant AMIGO along with the remaining amount of water necessary to fill the spray tank.
6. Continue to agitate or run the by-pass system.
7. On repeat tankloads, prepare a MUSTER/water slurry and add to required water volume in the spray tank prior to adding SELECT and AMIGO.
8. After any break in the spraying operation, agitate thoroughly before spraying again. Check inside the tank to ensure that sprayer agitation is sufficient to re-mix the spray materials. Do not allow the mixture to sit overnight.
9. Immediately after use, refer to MUSTER label for appropriate tank cleanout instructions.

### **SELECT AND LIBERTY® 150 SN – PRAIRIE PROVINCES AND PEACE RIVER REGION OF BRITISH COLUMBIA ONLY:**

**Canola: For use on Glufosinate Ammonium tolerant canola varieties only (e.g.varieties or hybrids labelled LIBERTYLINK).**

**SELECT** may be tank-mixed with LIBERTY 150 SN Herbicide for control of certain broadleaf and grass weeds in Glufosinate Ammonium tolerant canola varieties in one spray operation. For ground applications, apply in a minimum of 110 L/ha spray volume at a pressure of 275 kPa. For aerial applications apply this tank-mix in a minimum of 55 L/ha spray volume at a pressure of 300 kPa.

Follow all precautions, limitations and timing recommendations on the LIBERTY 150 SN Herbicide label.

**Time of Application:** Glufosinate Ammonium tolerant canola varieties may be treated from the cotyledon stage up to the early bolting stage. Apply when the wild oats, volunteer wheat, volunteer oats and green foxtail are in the 1- to 5-leaf stage. Refer to the LIBERTY 150 SN Herbicide label for application timing on all remaining grass and broadleaf weeds for 2.67 or 4.0 L/ha.

**Application Rate:** **SELECT** at 63 mL/ha tank-mixed with LIBERTY 150 SN Herbicide at 2.67 to 4.0 L/ha and with the adjuvant AMIGO at 0.5 % v/v.

**Weeds Controlled:** Wild oats, green foxtail, volunteer barley, volunteer wheat, volunteer oats plus all remaining grass weeds and broadleaf weeds listed on the LIBERTY 150 SN Herbicide label at the application rates of 2.67 and 4.0 L/ha.

### **MIXING INSTRUCTIONS:**

1. Thoroughly clean the sprayer by flushing the system with water containing detergent.
2. Fill clean spray tank half full with clean water. Start agitation system.
3. Add the required amount of AMIGO adjuvant to the tank. Continue to agitate until thoroughly mixed.
4. STOP agitation. Add the correct amount of LIBERTY 150 SN Herbicide to the spray tank. Start agitation system.
5. Add the correct amount of SELECT along with the remaining amount of water necessary to fill the spray tank.
6. Continue to agitate or run the by-pass system and spray out immediately.
7. After any break in the spraying operation, agitate thoroughly before spraying again. Check inside the tank to ensure that sprayer agitation is sufficient to re-mix the spray materials. Do not allow the mixture to sit overnight. In the case of tank mixtures with broadleaf herbicides, settling will occur if agitation is not continuous.

8. If an oil film starts to build up in the tank, drain it and clean tank with strong detergent solution.
9. Immediately after use, thoroughly clean the sprayer by flushing the system with clean water containing detergent.

#### **SELECT AND LIBERTY 200 SN – EASTERN CANADA AND BRITISH COLUMBIA ONLY**

**SECTA: For use on Glufosinate Ammonium tolerant canola varieties only (e.g. varieties or hybrids labelled LIBERTYLINK).**

**SELECT** may be tank-mixed with LIBERTY 200 SN Herbicide for control of certain broadleaf and grass weeds in Glufosinate Ammonium tolerant canola varieties in one spray operation. Apply in a minimum of 110 L/ha spray volume at a pressure of 275 kPa. Follow all precautions, limitations and timing recommendations on the LIBERTY 200 SN Herbicide label.

**Time of Application:** Glufosinate Ammonium tolerant canola varieties may be treated from the cotyledon stage up to the early bolting stage. Apply when the wild oats, volunteer wheat, volunteer oats and green foxtail are in the 1- to 5-leaf stage. Refer to the LIBERTY 200 SN Herbicide label for application timing on all remaining grass and broadleaf weeds for 2.0 or 2.5 L/ha.

**Application Rate:** **SELECT** at 63 mL/ha tank-mixed with LIBERTY 200 SN Herbicide at 2.0 to 2.5 L/ha and with the adjuvant AMIGO at 0.5% v/v.

**Weeds Controlled:** Wild oats, green foxtail, volunteer barley, volunteer wheat, volunteer oats plus all remaining grass weeds and broadleaf weeds listed on the LIBERTY 200 SN Herbicide label at the application rates of 2.0 and 2.5 L/ha.

#### **MIXING INSTRUCTIONS:**

1. Thoroughly clean the sprayer by flushing the system with water containing detergent.
2. Fill clean spray tank half full with clean water. Start agitation system.
3. Add the required amount of AMIGO adjuvant to the tank. Continue to agitate until thoroughly mixed.
4. STOP agitation. Add the correct amount of LIBERTY 200 SN Herbicide to the spray tank. Start agitation system.
5. Add the correct amount of **SELECT** along with the remaining amount of water necessary to fill the spray tank.
6. Continue to agitate or run the by-pass system and spray out immediately.
7. After any break in the spraying operation, agitate thoroughly before spraying again. Check inside the tank to ensure that sprayer agitation is sufficient to re-mix the spray materials. Do not allow the mixture to sit overnight. In the case of tank mixtures with broadleaf herbicides, settling will occur if agitation is not continuous.
8. If an oil film starts to build up in the tank, drain it and clean tank with strong detergent solution.
9. Immediately after use, thoroughly clean the sprayer by flushing the system with clean water containing detergent.

#### **MINOR USES:**

#### **NOTE TO USER:**

**READ THE FOLLOWING BEFORE USING THIS PRODUCT FOR THE INDICATED SPECIAL USE APPLICATIONS (LISTED BELOW):**

The **DIRECTIONS FOR USE** for this product for the uses described below were developed by persons other than Arysta LifeScience (Arysta) and accepted for registration by Health Canada under the User Requested Minor Use Label Expansion program. Arysta itself makes no representation or warranty with respect to performance (efficacy) or crop tolerance (phytotoxicity) claims for this product when used on the crops listed below. Accordingly, the Buyer and User assume all risks related to performance and crop tolerance arising, and agree to hold Arysta harmless from any claims based on efficacy or phytotoxicity in connection with the uses described below.

**MINOR USES:**

CROP	Weeds Controlled	Application Rate of:		Remarks
		SELECT	AMIGO	
<b>PRAIRIE CARNATION</b>	Annual weeds listed on <b>SELECT</b> label. Refer to weed/rate chart in this label.	0.19 L/ha	0.5 % v/v	<b>TIME OF APPLICATION:</b> Apply <b>SELECT</b> post-emergence of weeds and crop. Apply a maximum of one application per year using ground equipment. Apply in a minimum spray volume of 110 L/ha. Do not harvest treated Prairie Carnation for human consumption. <b>Ground application only.</b>
<b>Edamame, Edible-podded legume vegetables (Crop subgroup 6A):</b> Bean ( <i>Phaseolus</i> spp.) (includes runner bean, snap bean, wax bean), Bean ( <i>Vigna</i> spp.) (includes asparagus bean, Chinese longbean, moth bean, yardlong bean), Jackbean ( <i>Canavalia ensiformis</i> ), Pea ( <i>Pisum</i> spp.) (includes dwarf pea, edible-pod pea, snow pea, sugar snap pea), Pigeon pea ( <i>Cajanus cajan</i> ), Soybean (immature seed) ( <i>Glycine max</i> ), Sword bean ( <i>Canavalia gladiata</i> ). <b>Succulent shelled peas and beans (Crop subgroup 6B):</b> Bean ( <i>Phaseolus</i> spp.) (includes lima bean, green bean), Bean ( <i>Vigna</i> spp.) (includes blackeyed pea, cowpea, southern pea), Broad bean (fava bean) ( <i>Vicia faba</i> ), Pea ( <i>Pisum</i> spp.) (includes English pea, garden pea, green pea), Pigeon pea ( <i>Cajanus cajan</i> ).	Labelled grassy weeds. Refer to weed/rate chart in this label	0.19 L/ha	0.5% v/v	Apply <b>SELECT</b> post-emergence of weeds and crop. Apply a maximum of one application per year using ground equipment. Apply in a minimum spray volume of 110 L/ha. Observe a PHI of 21 days. Ground application only.



MINOR USES: (continued)

CROP	Weeds Controlled	Application Rate of:		Remarks
		SELECT	AMIGO	
<p><b>CHERRY (SWEET AND TART)</b> (established trees)</p>	<p>Labelled grassy weeds. Refer to weed/rate chart in this label.</p>	<p>0.19 – 0.38 L/ha</p>	<p>0.5 – 1.0 % v/v</p>	<p><b>TIME OF APPLICATION:</b> Apply <b>SELECT</b> to established sweet and tart cherry trees, post-emergence of weeds. Do not apply <b>SELECT</b> directly over the top of the trees. Direct the spray at the base of the tree where grassy weeds are growing. If <b>SELECT</b> is improperly applied, crop injury can occur.</p> <p>Apply a maximum of one application per year using ground equipment.</p> <p>Apply in a minimum spray volume of 100 litres of water per hectare.</p> <p>Observe a PHI of 14 days.</p> <p>Ground application only.</p>
<p><b>HIGHBUSH BLUEBERRY</b></p>	<p><b>SELECT</b> labelled grassy weeds. Refer to weed/rate chart in this label.</p>	<p>0.19-0.38 L/ha</p>	<p>0.5 to 1.0 % v/v</p>	<p><b>TIME OF APPLICATION:</b> Apply <b>SELECT</b> post-emergence of weeds and crop.</p> <p>Apply a maximum of one application per year, post-emergent by ground equipment.</p> <p>Apply as a broadcast spray directed to the ground.</p> <p>Apply in a minimum spray volume of 100 L/ha.</p> <p>Observe a PHI of 14 days.</p> <p><b>Ground application only.</b></p>

MINOR USES: (continued)

CROP	Weeds Controlled	Application Rate of:		Remarks
		SELECT	AMIGO	
<b>CORIANDER, (Cilantro), CARAWAY</b>	Labelled grassy weeds. Refer to weed/rate chart in this label	0.19-0.38 L/ha Refer to <b>SELECT</b> + AMIGO weed/rate chart in this label.	0.5-1.0% v/v Refer to <b>SELECT</b> + AMIGO weed/rate chart in this label.	<b>TIME OF APPLICATION:</b> Apply <b>SELECT</b> post-emergence of weeds and crop. Apply a maximum of one application per year, using ground equipment. Observe a PHI of 30 days for leaves and 60 days for seed. <b>Ground application only.</b>
<b>DILL</b>	Labelled grassy weeds. Refer to weed/rate chart on this label.	0.19-0.38 L/ha	0.5-1.0% v/v	<b>TIME OF APPLICATION:</b> Apply <b>SELECT</b> post-emergence of weeds and crop when dill is in the 3- to 5-leaf stage. Apply a maximum of one application per year using ground equipment. Apply a minimum spray volume of 100 L/ha. Observe a PHI of 30 days for dillweed leaves and a PHI of 40 days for dill seed. <b>Ground application only.</b>
<b>CHIVE</b>	Labelled grassy weeds. Refer to weed/rate chart in this label	0.19 – 0.38 L/ha Refer to <b>SELECT</b> + AMIGO weed/rate chart in this label.	0.5 – 1.0 % v/v Refer to <b>SELECT</b> + AMIGO weed/rate chart in this label.	<b>TIME OF APPLICATION:</b> Apply a maximum of one application per year, post-emergent using ground equipment. Apply in a minimum spray volume of 110 L/ha. Observe a PHI of 30 days. Ground application only.

**MINOR USES:** (continued)

CROP	Weeds Controlled	Application Rate of:		Remarks
		SELECT	AMIGO	
Angelica; balm (lemon balm); basil; borage; burnet; chamomile; catnip; chervil; clary; costmary; culantro (leaf); horehound; hyssop; lavender; lovage; marigold; marjoram (includes sweet or annual marjoram, wild marjoram or oregano and pot marjoram); nasturtium; parsley (dried); pennyroyal; rosemary; rue; sage; savory, summer and winter; sweet bay (bay leaf); tansy; tarragon; thyme; wintergreen; woodruff; and wormwood	Labelled grassy weeds. Refer to weed/rate chart in this label.	0.19 L/ha	0.5 % v/v	<b>TIME OF APPLICATION:</b> Apply <b>SELECT</b> post-emergence of weeds and crop. Apply a maximum of one application per year using ground equipment. Apply as a broadcast spray directed to the ground. Apply in a minimum spray volume of 110 L/ha. Observe a PHI of 30 days. Ground application only.
Anise (anise seed), caraway (black); celery seed; culantro (seed); cumin; fennel [common and Florence (seed)]; juniper berry; lovage (seed); mustard (seed); poppy (seed); and saffron	Labelled grassy weeds. Refer to weed/rate chart in this label.	0.19 L/ha	0.5 % v/v	<b>TIME OF APPLICATION:</b> Apply <b>SELECT</b> post-emergence of weeds and crop. Apply a maximum of one application per year using ground equipment. Apply as a broadcast spray directed to the ground. Apply in a minimum spray volume of 110 L/ha. Observe a PHI of 60 days. Ground application only.
<b>HOPS</b>	Labelled grassy weeds. Refer to weed/rate chart in this label.	0.19-0.38 L/ha	0.5 -1.0% v/v	<b>TIME OF APPLICATION:</b> post-emergence of weeds and crop. Apply a maximum of one application per season, using ground equipment. Apply as a broadcast spray directed to the ground. Apply in a minimum spray volume of 110 litres of water per hectare. Observe a PHI of 21 days. Ground application only.

MINOR USES: (continued)

CROP	Weeds Controlled	Application Rate of:		Remarks
		SELECT	AMIGO	
FENUGREEK	Annual weeds listed on <b>SELECT</b> label	Refer to <b>SELECT + AMIGO</b> weed/rate chart in this label.	Refer to <b>SELECT + AMIGO</b> weed/rate chart in this label.	<b>TIME OF APPLICATION:</b> Apply <b>SELECT</b> post-emergent when fenugreek is in the 3 to 5 leaf stage. Apply a maximum of one application per season, using ground equipment. Apply in a minimum spray volume of 100L/ha. Observe a PHI of 30 days for leaves and seed. <b>Ground application only.</b>
<b>DRY BULB ONIONS, DRY BULB SHALLOT and GARLIC</b>	Labelled grassy weeds. Refer to weed/rate chart in this label.	0.19 - 0.38 L/ha	0.5 % v/v	<b>TIME OF APPLICATION:</b> Apply <b>SELECT</b> post-emergent when the crop is in the 1- to 4-leaf stage. Apply a maximum of one application per season, using ground equipment. Observe a PHI of 45 days. <b>Ground application only.</b>
<b>SAFFLOWER</b>	Annual weeds listed on <b>SELECT</b> label	0.19-0.38 L/ha	0.5-1.0% v/v	<b>TIME OF APPLICATION:</b> Apply <b>SELECT</b> post-emergent when safflower is in the 6- to 8-leaf stage. Apply a maximum of one application per season using ground equipment. Apply in a minimum spray volume of 100 litres of water per hectare. Observe a PHI of 70 days. <b>Ground application only.</b>

MINOR USES: (continued)

CROP	Weeds Controlled	Application Rate of:		Remarks
		SELECT	AMIGO	
SPINACH	Annual Weeds listed on <b>SELECT</b> label	Refer to <b>SELECT</b> + AMIGO weed/rate chart in this label.	Refer to <b>SELECT</b> + AMIGO weed/rate chart in this label.	Apply a maximum of two applications per year with 14 days between applications, post emergent by ground application when grassy weeds are in the 2- to 6-leaf stage. Observe a PHI of 14 days. <b>Ground application only.</b>
CRANBERRY	Labelled grassy weeds. Refer to weed/rate chart in this label.	0.19-0.38 L/ha	0.5-1.0% v/v	TIME OF APPLICATION: Apply <b>SELECT</b> post-emergence of weeds and crop. Do not apply between the hook stage and full fruit set. Apply a maximum of one application per year using ground equipment. Apply in a minimum spray volume of 110 L of water /ha. Observe a PHI of 30 days.
RED GARDEN (TABLE) BEET, PARSNIP, CARROT, RADISH	Labelled grassy weeds. Refer to weed/rate chart in this label.	0.19-0.38 L/ha	0.5-1.0% v/v	TIME OF APPLICATION: Apply <b>SELECT</b> post-emergence of weeds and crop using ground equipment. Apply a maximum of two applications per year. If repeat application is required, allow at least 14 days between first and second application. <b>Do not apply more than 0.38 L/ha (90 grams ai/ha) per crop season.</b> Apply in a minimum spray volume of 110 L/ha. Observe a PHI of 30 days. Ground application only.

## **APPLICATION INSTRUCTIONS:**

### **GROUND APPLICATION**

#### **Water volume and spray pressure:**

For ground application, use sprayers equipped with standard flat fan nozzles. For optimum spray coverage, use nozzles tilted 45° forward.

The use of flood jet or hollow cone nozzles is not recommended because of uneven and inadequate spray coverage. Thorough and uniform spray coverage over the entire leaf area of the target weeds is necessary for optimum weed control.

Thoroughly clean all screens to prevent nozzle clogging, especially when spray volumes of 55 to 110 L/ha are used.

For ground applications, use spray volumes of 55 to 225 L/ha and a minimum of 275 kPa pressure. For applications to dense weed infestations or to dense crop canopies, use a minimum of 110 L/ha spray volume at pressures of 275 to 425 kPa. In any situation, ensure the proper rate of AMIGO is maintained as listed on the label under APPLICATION RATES OF **SELECT**.

For legume vegetables (succulent or dried) (except soybeans) and edamame, a minimum spray volume of 110 L/ha is recommended.

### **AERIAL APPLICATION**

#### **Water volume and spray pressure:**

Apply **SELECT** alone or in tank mixes (ONLY with the recommended tank mix partners that are registered for aerial use) in no less than 28 L/ha spray volume at a pressure no less than 300 kPa.

Apply only by fixed-wing or rotary aircraft equipment which has been functionally and operationally calibrated for the atmospheric conditions of the area and the application rates and conditions of this label.

Label rates, conditions and precautions are product specific. Read and understand the entire label before opening this product. Apply only at the rate recommended on this label.

When applying **SELECT** by aircraft, uniform coverage is essential. To avoid streaked, uneven or overlapped application, use appropriate marking devices.

#### **Aerial Use Precautions**

- Read and understand the entire label before opening this product. If you have questions, call Arysta LifeScience North America, LLC at 1-866-761-9397 or obtain technical advice from the distributor or your provincial agricultural representative.
- Apply only when meteorological conditions at the treatment site allow for complete and even crop coverage. Apply only under conditions of good practice specific to aerial application as outlined in the National Aerial Pesticide Application Manual, developed by the Federal/Provincial/Territorial Committee on Pest Management and Pesticides.
- Do not apply to terrain where there is a potential for surface run-off to enter aquatic systems.
- Do not apply to any body of water. Avoid drifting of spray onto any body of water or other non-target areas. Specified buffer zones should be observed.
- Do not apply during periods of dead calm or when wind velocity and direction pose a risk of spray drift.
- Do not apply when wind speed is greater than 16 km/h at a flying height at the site of application.
- Do not apply with spray droplets smaller than ASAE medium classification.

**Aerial Operator Precautions:**

- Do not allow the pilot to mix chemicals to be loaded onto the aircraft. Loading of premixed chemicals with a closed system is permitted.
- It is desirable that the pilots have communication capabilities at each treatment site at the time of application.
- The field crew and the mixer/loaders must wear goggles or face shield, rubber apron, chemical-resistant gloves, rubber boots, long sleeved shirt and long-legged pants.
- All personnel on the job site must wash hands and face thoroughly before eating and drinking. Protective clothing, aircraft cockpit and vehicle cabs must be decontaminated regularly.

**Product Specific Precautions:**

- Read and understand the entire label before opening this product. If you have questions, call the manufacturer at 1-866-761-9397 or obtain technical advice from the distributor or your provincial agricultural representative.

**DO NOT** apply during periods of dead calm. Avoid application of this product when winds are gusty.

**DO NOT** apply when wind speed is greater than 16 km/h at flying height at the site of application.

**DO NOT** apply with spray droplets smaller than the American Society of Agricultural Engineers (ASAE) medium classification. To reduce drift caused by turbulent wingtip vortices, the nozzle distribution along the spray boom length **MUST NOT** exceed 65% of the wing- or rotorspan.

**Buffer zones:**

The buffer zones specified in the table below are required between the point of direct application and the closest downwind edge of sensitive terrestrial habitats (such as grasslands, forested areas, shelter belts, woodlots, hedgerows, riparian areas and shrublands).

Method of application	Crop	Buffer Zones (metres) required for the protection of terrestrial habitat:	
Field sprayer	All labelled crops	15	
Aerial	Canola, field peas, flax, lentils, brown mustard, yellow mustard, <i>Brassica carinata</i> , potatoes, soybeans, sunflowers	Fixed wing	20
		Rotary wing	20
	Bean ( <i>Lupinus</i> spp.) (includes grain lupin, sweet lupin, white lupin and white sweet lupin); Bean ( <i>Phaseolus</i> spp.) (includes field bean, kidney bean, lima bean (dry), navy bean, pinto bean, tepary bean); Bean ( <i>Vigna</i> spp.) (includes adzuki bean, blackeyed pea, catjang, cowpea, Crowder pea, moth bean, mung bean, rice bean, southern pea, urd bean); Broad bean (fava bean) ( <i>Vicia faba</i> ); Chickpea (garbanzo bean) ( <i>Cicer arietinum</i> ); Guar ( <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> ); Lablab bean (hyacinth bean) ( <i>Lablab purpureus</i> ); Pigeon pea ( <i>Cajanus cajan</i> )	Fixed wing	15
		Rotary wing	15

**For Cherry (sweet and tart):**

Use of the following spray methods or equipment DO NOT require a buffer zone: hand-held or backpack sprayer and spot treatment, *inter-row hooded sprayer, low-clearance hooded or shielded sprayers that ensure spray drift does not come in contact with orchard crop fruit or foliage.*

For tank mixes, consult the labels of the tank-mix partners and observe the largest (most restrictive) buffer zone of the products involved in the tank mixture and apply using the coarsest spray (ASAE) category indicated on the labels for those tank mix partners.

**RESTRICTIONS AND LIMITATIONS:**

1. Use only for crops listed on the label.
2. Thorough preplant tillage operations are required to fields where sod or forage grass crops may have grown in the previous year.
3. Take necessary precautions to avoid sprayer overlaps.
4. Rainfall within one hour of application may reduce the effectiveness of the spray.
5. Do not mix or apply SELECT Emulsifiable Concentrate Post-Emergence Herbicide with any other additive, pesticide or with fertilizer except as specifically recommended on the label.
6. Allow 4 days between application of SELECT and any other chemical not recommended as a tank-mix combination on the label.
7. Do not apply more than 0.38 L/ha (90 grams a.i./ha) per season.
8. Do not use crops for grazing of livestock or green feed following application of SELECT until after the appropriate interval as specified in the crop recommendations table has been observed. Do not cut treated crops for forage until the appropriate interval as specified in the crop recommendations table has been observed.
9. SELECT may be applied by air for certain crops specified in this label.
10. DO NOT enter or allow worker entry into treated areas during the restricted entry interval (REI) of 12 hours.

**HERBICIDE RESISTANCE MANAGEMENT RECOMMENDATIONS:**

For resistance management, **SELECT** is a Group 1 herbicide. Any weed population may contain or develop plants naturally resistant to **SELECT** and other Group 1 herbicides. The resistant biotypes may dominate the weed population if these herbicides are used repeatedly in the same field. Other resistance mechanisms that are not linked to site of action, but specific for individual chemicals, such as enhanced metabolism, may also exist. Appropriate resistance-management strategies should be followed.

To delay herbicide resistance:

- Where possible, rotate the use of SELECT or other Group 1 herbicides with different herbicide groups that control the same weeds in a field.
- Use tank mixtures with herbicides from a different group when such use is permitted.
- Herbicide use should be based on an IPM program that includes scouting, historical information related to herbicide use and crop rotation, and considers tillage (or other mechanical), cultural, biological and other chemical control practices.
- Monitor treated weed populations for resistance development.
- Prevent movement of resistant weed seeds to other fields by cleaning harvesting and tillage equipment and planting clean seed.
- Contact your local extension specialist or certified crop advisors for any additional pesticide resistance-management and/or integrated weed-management recommendations for specific crops and weed biotypes.
- For further information or to report suspected resistance, contact Arysta LifeScience North America, LLC at 1-866-761-9397.



**NOTICE TO USER:** This pest control product is to be used only in accordance with the directions on the label. It is an offence under the *Pest Control Products Act* to use this product in a way that is inconsistent with the directions on the label.

Arysta LifeScience and the Arysta LifeScience logo are registered trademarks of Arysta LifeScience Corporation.

SELECT and AMIGO are registered trademarks of an Arysta LifeScience Group Company.

BUCTRIL and LIBERTY are registered trademarks of Bayer.

LONTREL and CURTAIL are registered trademarks of Dow AgroSciences LLC.

MUSTER is a registered trademark of E.I. DuPont de Nemours and Company.

PURSUIT is a registered trademark of BASF.

©2018 Arysta LifeScience Group Company.



# Select®

UTILISER AVEC L'ADJUVANT AMIGO®

**CONCENTRÉ ÉMULSIFIABLE  
HERBICIDE DE POSTLEVÉE**

**CONTAINS CLETHODIM**

**GRUPE 1 HERBICIDE**

HERBICIDE DE POSTLEVÉE POUR LA SUPPRESSION DES GRAMINÉES DANS LES SEMIS DE LUZERNE, LES GRAINES VERTES OU SÈCHES DE LÉGUMINEUSES ET EDAMAME, LES BLEUETS EN CORYMBE, LE CANOLA, LE BASILIC, LA CORIANDRE, L'ANETH, LE CARVI COMMUN, LE FENUGREC, LA CANNEBERGE, LE LIN (y compris les variétés à basse teneur en acide linoléique), LA MOUTARDE JONCÉE (types condimentaire et à graine oléagineuse), LE *BRASSICA CARINATA*, LA MOUTARDE JAUNE, LES OIGNONS SEC, L'ÉCHALOTE, BULBE ET L'AIL, LES POMMES DE TERRE, LES PRAIRIE CARNATION, LE CARTHAME, LE SOJA, L'ÉPINARD, LE TOURNESOL, LA BETTERAVE POTAGÈRE, LE PANAI, LA CAROTTE, LE RADIS, LA CERISE (DOUCE ET ACIDE), CERTAINES FINES HERBES, ET ÉPICES, ET LE HOUBLON.

**AGRICOLE**

**GARANTIE : CLÉTHODIME..... 240 g/L**

No D'HOMOLOGATION : 22625  
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

**AVERTISSEMENT : IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L'EMPLOI**

En cas d'urgence médicale, appeler PROPHARMA au 1-866-303-6952 ou +1-651-603-3432.

En cas d'urgence chimiques (déversements, fuites, incendie, exposition ou accident) appeler CHEMTREC  
au 1-800-424-9300 ou +1-703-527-3887.

Renseignements sur le produit : 1-866-761-9397

ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA, LLC  
15401 Weston Parkway, Suite 150  
Cary, NC 27513  
États-Unis

032218V002  
102759-D(0918)

**CONTENU NET : 3 LITRES**

 **Arysta**  
LifeScience

## RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

**SELECT**<sup>®</sup> est un herbicide de postlevée sélectif utilisé pour la suppression d'une vaste gamme de graminées dans les semis de luzerne, les graines vertes ou sèches de légumineuses et edamame, les bleuets en corymbe, le canola, la coriandre, l'aneth, le carvi commun, le fenugrec, la canneberge, le lin (y compris les variétés à basse teneur en acide linoléique), la moutarde orientale (de types condimentaire et oléagineuse), le *Brassica carinata*, la moutarde jaune, les oignons secs, l'échalote, bulbe et l'ail, les pomme de terre, les Prairie Carnation, le carthame, le soja, l'épinard, le tournesol, le basilic, la betterave potagère, le panais, le carotte, le radis, la cerise (douce et acide), certaines fines herbes, et épices, et le houblon.

**SELECT doit être utilisé seulement avec l'adjuvant AMIGO**<sup>®</sup>.

**SELECT** est un herbicide systémique qui est diffusé du feuillage traité vers les points de croissance des feuilles, des tiges et des racines. L'absorption par la plante s'effectue surtout au niveau des feuilles. Une bonne couverture du feuillage est importante afin d'assurer une suppression efficace des graminées. Les graminées sensibles qui sont en pleine croissance présenteront des brûlures et un changement de couleur après le traitement. En premier lieu, le feuillage passera du vert au jaunâtre, puis au violacé et finalement au brun. Le temps requis pour une suppression complète est normalement de 7 à 21 jours après le traitement, selon les conditions de croissance et de la concurrence offerte par la culture.

## PRÉCAUTIONS

**GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. PROVOQUE UNE IRRITATION DES YEUX ET DE LA PEAU.** Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Laver immédiatement la peau et les yeux éclaboussés par ce produit concentré. Ne pas inhaler les émanations. Éviter de respirer les brumes ou le brouillard de pulvérisation de ce produit. Se laver les mains et la peau exposées après l'emploi de ce produit. Lors de l'utilisation, éviter de manger, boire ou fumer. Enlever et laver séparément les vêtements contaminés avant de les réutiliser. Entreposer le contenant fermé hermétiquement loin des semences, aliments pour animaux, engrais, plantes et denrées alimentaires. Respecter les normes provinciales quant aux zones à protéger autour des étendues d'eau et les marécages. Lors de la manipulation, du mélange, du chargement, du nettoyage et des activités de réparations, porter des lunettes protectrices ou un écran facial, un tablier de caoutchouc, des gants résistant aux produits chimiques, des bottes de caoutchouc, une chemise à manches longues et un pantalon long. Porter une chemise à manches longues, un pantalon long et des gants résistants aux produits chimiques durant la pulvérisation. Les gants résistants aux produits chimiques ne sont pas nécessaire pour l'application avec une rampe ou pour l'application aérienne.

Appliquer seulement lorsque le potentiel de dérive est au minimum vers les zones d'habitation ou vers des zones d'activité humaine telles des résidences, chalets, écoles et superficies récréatives. Prendre en considération la vitesse et la direction du vent, les inversions de température, la calibration de l'équipement d'application et du pulvérisateur.

**NE PAS retourner ni permettre le retour des travailleurs dans la zone traitée durant le délai de sécurité (DS) de 12 heures.**

### DANGERS ENVIRONNEMENTAUX

**TOXIQUE** pour les plantes terrestres non ciblées. Respecter les zones tampons indiquées à la section MODE D'EMPLOI.

Éviter la dérive de pulvérisation. Éviter la contamination des étangs, des ruisseaux, des rivières et de la végétation à préserver.

Ce produit contient un distillat de pétrole qui peut être modérément ou hautement toxique pour les organismes aquatiques. Éviter toute contamination des systèmes aquatiques durant l'application. Ne pas contaminer ces systèmes par l'application directe de ce produit, l'élimination des déchets ou le nettoyage de l'équipement.

### **PREMIERS SOINS**

**En cas d'ingestion :** Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**En cas de contact avec la peau ou les vêtements :** Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas de contact avec les yeux :** Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'œil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**En cas d'inhalation :** Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

**RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:** Traiter selon les symptômes. Ce produit contient des distillats de pétrole. Le vomissement peut causer une pneumonie de déglutition. Lorsqu'on envisage un lavage d'estomac, le danger consécutif à l'aspiration de solvants à base de pétrole par les poumons doit être évalué en fonction de leur toxicité.

## **ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION**

### **ENTREPOSAGE :**

Produit entreposable à toute température. **BIEN AGITER AVANT L'EMPLOI.** Les insecticides et les fongicides doivent être entreposés à part des herbicides afin de prévenir une possibilité de contamination croisée.

### **ÉLIMINATION :**

**ÉLIMINATION DES CONTENANTS RECYCLABLES :** Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Il s'agit d'un contenant recyclable qui doit être éliminé à un point de collecte des contenants. S'enquérir auprès de son distributeur ou de son détaillant ou encore auprès de l'administration municipale pour savoir où se trouve le point de collecte le plus rapproché. Avant d'aller y porter le contenant :

1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au mélange à pulvériser dans le réservoir.
2. Rendre le contenant inutilisable.

S'il n'existe pas de point de collecte dans votre région, éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.

**ÉLIMINATION DES PRODUITS NON UTILISÉS OU DONT ON VEUT SE DÉPARTIR:** Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

## MODE D'EMPLOI

Puisque ce produit n'est pas homologué pour la suppression des organismes nuisibles dans les systèmes aquatiques, NE PAS l'utiliser pour supprimer les organismes nuisibles aquatiques.

NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation ni les habitats aquatiques lors du nettoyage de l'équipement ou de l'élimination de déchets.

## PÉRIODE D'APPLICATION

Appliquer **SELECT** lorsque les graminées indésirables et les céréales spontanées sont au stade 2 à 6 feuilles, tel qu'indiqué à la section Taux d'application de **SELECT**. On obtient la suppression la plus efficace lorsque le traitement est fait avant le tallage, quand les graminées indésirables sont petites et en pleine croissance.

Pour la répression ou la suppression du chiendent, appliquer **SELECT** lorsque le chiendent est au stade 2 à 6 feuilles et lorsqu'il a de 6 à 15 cm de hauteur. Les résultats sont plus efficaces lorsque l'application est faite au stade 3 à 5 feuilles, quand le couvert du chiendent est uniforme et qu'il est en pleine croissance.

**SELECT** sera moins efficace lorsque les plantes subissent un stress lié à un manque ou à un excès d'humidité, à de faibles températures et/ou à une humidité relative très faible. Une repousse par le tallage peut se produire si l'application est effectuée lorsque prévaut l'une des conditions mentionnées précédemment. Dans les cultures à grand interligne où le couvert végétal peut prendre un certain temps à se former complètement, le travail du sol peut être nécessaire pour supprimer les graminées qui lèvent après le traitement.

Pour les pois chiches, faire un maximum d'une application de **SELECT** par saison avant que la culture ait atteint le stade 9 nœuds (18 cm de hauteur au maximum) et lorsque les graminées annuelles indésirables et les céréales spontanées sont au stade 2 à 6 feuilles.

Pour l'aneth et le fenugrec, appliquer **SELECT** en postlevée lorsque la culture est au stade 3 à 5 feuilles, à raison d'un maximum d'une application par saison.

Pour les Prairie Carnation, appliquer **SELECT** en postlevée lorsque ces cultures sont au stade 2 à 5 feuilles. On peut faire un maximum d'une application par année.

Pour le carthame, appliquer **SELECT** en postlevée lorsque la culture est au stade 6 à 8 feuilles, à raison d'un maximum d'une application par saison.

La canneberge tolère **SELECT** à tous les stades de croissance; cependant, ne pas appliquer **SELECT** entre le stade de la crosse et la pleine floraison.

Pour les oignons secs, l'échalote, bulbe et l'ail appliquer **SELECT** en post-levée lorsque ces cultures sont au stade de 1 à 4 feuilles.

Appliquer **SELECT** uniquement sur les cerisiers établis (douces et acides). Le délai d'attente avant la récolte (DAAR) indiqué dans les RECOMMANDATIONS POUR LES CULTURES doit être respecté afin d'éviter tout excès de résidus dans les cultures.

Toutes les autres cultures indiqués sur l'étiquette sont tolérantes à **SELECT** à tous les stades de croissance. Cependant, le délai d'attente avant la récolte indiqué dans les RECOMMANDATIONS POUR LES CULTURES doit être respecté afin d'éviter tout excès de résidus dans les cultures.

## TAUX D'APPLICATION DE SELECT

Les taux à utiliser pour supprimer diverses espèces de graminées sont indiquées ci-après. Consulter la section sur les cultures afin de connaître le taux maximal à utiliser pour chacune des cultures.

Graminées	Stade foliaire	Taux d'application de SELECT	Taux d'application de l'adjuvant AMIGO
*Sétaire (verte, glauque) Folle avoine Céréales spontanées (blé, orge, avoine)	2 à 4	0,125 L/ha	0,5 % v/v
Pied-de-coq Panic capillaire Panic d'automne Panic millet Maïs spontané Alpiste des Canaries spontané	2 à 6	0,125 L/ha	0,5 % v/v
Folle avoine Céréales spontanées (blé, orge, avoine) Sétaire (verte, glauque) Ivraie de perse Digitaire (astringente et sanguine) Panic millet Panic capillaire Panic d'automne Pied-de-coq Maïs spontané Alpiste des Canaries spontané Chiendent – répression	2 à 6	0,19 L/ha	0,5 % v/v
Chiendent – suppression**	2 à 6	0,38 L/ha	1,0 % v/v
Pâturin annuel - répression	2 à 6	0,38 L/ha	0,5 % v/v

\***SELECT** appliqué au taux de 0,125 L/ha pour supprimer les mauvaises herbes énumérées dans cette partie du tableau devrait être pulvérisé uniquement dans les conditions suivantes :

- Bon établissement de la culture
- Application hâtive (comme dans le tableau ci-dessus, avant le tallage)
- Ne pas mélanger en cuve avec d'autres pesticides
- Ne pas pulvériser sur les céréales d'hiver spontanées
- Infestation légère à modérée des mauvaises herbes
- Taux de fertilité et d'humidité appropriés
- Absence de stress et bonnes conditions de croissance

Si l'une des conditions susmentionnées n'est pas présente au moment de la pulvérisation, utiliser un taux de 0,19 L/ha de **SELECT**.

\*\* Pour obtenir une suppression appropriée du chiendent, utiliser un volume de pulvérisation d'au moins 100 L/ha.

#### RECOMMANDATIONS POUR LES CULTURES :

Cultures	Taux d'application maximum de SELECT	Méthode d'application <sup>6</sup>	Délai d'attente avant la récolte
Semis de luzerne	0,38 L/ha	Application terrestre seulement	30 jours
Pois cajan sec <sup>1,2</sup>	0,19 L/ha	Application terrestre et aérienne	75 jours
<p><b>Edamame, Légumineuses à gousse comestible (sous-groupe de culture 6A) :</b> Haricot (<i>Phaseolus</i> spp., y compris le haricot d'Espagne, le haricot vert et le haricot jaune); Dolique (<i>Vigna</i> spp., y compris le dolique asperge et le haricot papillon); Pois sabre (<i>Canavalia ensiformis</i>); Pois (<i>Pisum</i> spp., y compris le pois nain, le pois à gousse comestible, le pois mange-tout et le pois sugar snap); Pois cajan (<i>Cajanus cajan</i>); Soja (graines immatures) (<i>Glycine max</i>); Pois sabre (<i>Canavalia gladiata</i>).</p> <p><b>Légumineuses vertes à écosser (sous-groupe de culture 6B) :</b> Haricot (<i>Phaseolus</i> spp., y compris le haricot de Lima); Dolique à œil noir (<i>Vigna</i> spp.); Gourgame (fève des marais) (<i>Vicia faba</i>); Pois (<i>Pisum</i> spp., y compris le petit pois anglais, le petit pois de jardin et le petit pois vert); Pois cajan (<i>Cajanus cajan</i>).<sup>1,2,5</sup></p>	0,19 L/ha	Application terrestre seulement	21 jours



**RECOMMANDATIONS POUR LES CULTURES : (a continué)**

Cultures	Taux d'application maximum de SELECT	Méthode d'application <sup>6</sup>	Délai d'attente avant la récolte
<p><b>Graines sèches de légumineuses (sous-groupe de culture 6C) (sauf le soja, pois de grande culture, lentilles, pois cajan) y compris :</b></p> <p>Haricot (<i>Lupinus</i> spp.) (y compris le lupin-grain, le lupin doux, le lupin blanc et le lupin blanc doux); haricot (<i>Phaseolus</i> spp.) (y compris le haricot de grande culture, le haricot commun, le haricot de Lima (sec), le petit haricot blanc, le haricot pinto et le haricot tépary); haricot (<i>Vigna</i> spp.) (y compris l'adzuki, le dolique à œil noir, le dolique mongette, le haricot papillon, le haricot mungo, le pois zombi et le haricot mungo noir); gourgane (fève des marais) (<i>Vicia faba</i>); pois chiche (<i>Cicer arietinum</i>); guar (<i>Cyamopsis tetragonoloba</i>); dolique d'Égypte (<i>Lablab purpureus</i>);<sup>1,2</sup></p>	0,19 L/ha	Application terrestre et aérienne	60 jours
Carvi commun, coriandre <sup>1,5</sup>	0,38 L/ha	Application terrestre seulement	60 jours (graines) 30 jours (feuilles)
<p>Angélique, mélisse, basilic, bourrache, pimprenelle, camomille, cataire, cerfeuil, sauge sclarée, balsamite, coriandre du Mexique (feuille), marrube, hysope, lavande, livèche, souci officinal, origan (y compris la marjolaine, l'origan et l'origan de Chypre), capucine, persil séché, menthe pouliot, romarin, rue, sauge, sarriette (jardins et montagnes), laurier (lauriersauce), tanaïse, estragon, thym, thé des bois, aspérule odorante et absinthe<sup>1,2,4,7</sup></p>	0,19 L/ha	Application terrestre seulement	30 jours
<p>Anis (graine), nigelle, céleri (graine), coriandre du Mexique (graine), carvi commun, fenouil [fenouil et fenouil de Florence (graine)], baie de genévrier, livèche (graine) moutarde (graine), pavot (graine) et safran<sup>1,2,4,5</sup></p>	0,19 L/ha	Application terrestre seulement	60 jours
<p>Cerise (douce et acide)<sup>1,4,5,8</sup> (arbres établis)</p>	0,38 L/ha	Application terrestre seulement	14 jours

**RECOMMANDATIONS POUR LES CULTURES : (a continué)**

Cultures	Taux d'application maximum de SELECT	Méthode d'application <sup>6</sup>	Délai d'attente avant la récolte
Bleuets en corymbe <sup>1, 4, 5</sup>	0,38 L/ha	Application terrestre seulement	14 jours
Canola	0,38 L/ha	Application terrestre et aérienne	60 jours
Canneberge <sup>1,2,5</sup>	0,38 L/ha	Application terrestre seulement	30 jours
Ciboulette <sup>1,5</sup>	0,38 L/ha	Application terrestre seulement	30 jours
Aneth <sup>1,5</sup>	0,38 L/ha	Application terrestre seulement	30 jours (feuilles) 60 jours (graines)
Lin (y compris les variétés à basse teneur en acide linoléique)	0,38 L/ha	Application terrestre et aérienne	60 jours
Fenugrec <sup>1, 3, 5</sup>	0,38 L/ha	Application terrestre seulement	30 jours
Pois des champs	0,38 L/ha	Application terrestre et aérienne	75 jours
Houblon <sup>1,4,5</sup>	0,38 L/ha	Application terrestre seulement	21 jours
Lentilles	0,38 L/ha	Application terrestre et aérienne	60 jours
Moutarde joncée de types condimentaire et oléagineuse	0,38 L/ha	Application terrestre et aérienne	60 jours
Moutarde jaune	0,38 L/ha	Application terrestre et aérienne	60 jours
<i>Brassica carinata</i>	0,38 L/ha	Application terrestre et aérienne	60 jours
Oignons secs, échalote, bulbe et l'ail <sup>1,5</sup>	0,38 L/ha	Application terrestre seulement	45 jours
Betterave potagère, panais, carotte, radis <sup>3,5</sup>	0,38 L/ha	Application terrestre seulement	30 jours
Pommes de terre	0,38 L/ha	Application terrestre et aérienne	60 jours
Prairie Carnation <sup>1,5,6</sup>	0,19 L/ha	Application terrestre seulement	S.O.
Carthame <sup>1,5</sup>	0,38 L/ha	Application terrestre seulement	70 jours
Soja	0,38 L/ha	Application terrestre et aérienne	75 jours
Épinard <sup>3,5</sup>	0,19 L/ha	Application terrestre seulement	14 jours
Tournesol	0,38 L/ha	Application terrestre et aérienne	72 jours

1. Faire un maximum d'une application par année.
2. NOTE : Le degré de tolérance aux herbicides, dont **SELECT**, peut varier selon les variétés de cette culture. Comme la tolérance à **SELECT** de toutes les variétés n'a pas été testée, utiliser d'abord **SELECT** sur une petite parcelle de chaque variété afin de confirmer la tolérance, avant d'appliquer le produit à grande échelle. De plus, consulter votre fournisseur de semences pour obtenir des renseignements sur la tolérance de certaines variétés à **SELECT**.
3. Faire un maximum de deux applications par année. Si une autre application est nécessaire, prévoir au moins 14 jours entre la première et la seconde application.
4. Appliquer **SELECT** en un traitement généralisé dirigé vers le sol.
5. Consulter la section « USAGES LIMITÉS » de la présente étiquette pour obtenir des directives d'utilisation additionnelles.
6. Ne pas récolter les Prairie Carnation traitées pour la consommation humaine.
7. VOLUME DE PULVÉRISATION POUR L'APPLICATION AÉRIENNE : Appliquer dans 28 à 55 L/ha. Augmenter les volumes de pulvérisation jusqu'à 100 L/ha si le feuillage des graminées ou des cultures devient dense.
8. Ne pas appliquer **SELECT** directement au sommet des cerisiers doux et acide. Orienter la pulvérisation à la base de l'arbre où les mauvaises herbes graminées sont en croissance.

#### MÉLANGES EN CUVE

Lorsqu'il est appliqué comme mélange en réservoir, lire et observer toutes les instructions sur l'étiquette, y compris les taux, restrictions et limitations de pâturage pour chaque produit utilisé dans le mélange en réservoir. Suivre les mesures de précaution les plus strictes pour le mélange, le chargement et l'application telles que décrites sur les étiquettes des deux produits.

#### SELECT ET BUCTRIL® M

**Lin (y compris les variétés à basse teneur en acide linoléique) :** **SELECT** peut être mélangé en cuve avec BUCTRIL M afin de supprimer en une seule application certaines mauvaises herbes à feuilles larges et graminées indésirables dans le lin (y compris les variétés à basse teneur en acide linoléique). Appliquer dans 55 à 110 litres d'eau par hectare à une pression de 275 kPa. NE PAS pulvériser ce mélange en cuve lorsque les plantes subissent un stress. NE PAS pulvériser par temps chaud et humide. Respecter toutes les mises en garde, restrictions et recommandations en matière d'application qui figurent sur l'étiquette de BUCTRIL M.

**Période d'application :** Le lin (y compris les variétés à basse teneur en acide linoléique) peut être traité lorsqu'il atteint une hauteur de 5 cm jusqu'au début du stade du bouton. Afin d'obtenir de meilleurs résultats, appliquer lorsque le lin (y compris les variétés à basse teneur en acide linoléique) a de 5 à 10 cm de hauteur et que les mauvaises herbes sont au stade de la plantule. Si les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées indésirables n'atteignent pas en même temps le stade de traitement recommandé, il faut alors faire deux applications séparées.

**Taux d'application :** **SELECT** à raison de 0,19 L à 0,38 L/ha, mélangé en cuve avec BUCTRIL M à raison de 1,0 L/ha et avec l'adjuvant AMIGO à une concentration de 0,5 % à 1,0 % v/v.

**Mauvaises herbes supprimées :** Tel qu'indiqué pour **SELECT** utilisé seul et également pour certaines plantules de mauvaises herbes à feuilles larges. Consulter l'étiquette de BUCTRIL M pour connaître les mauvaises herbes à feuilles larges supprimées.

## INSTRUCTIONS DE MÉLANGE :

1. Bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau et de détergent.
2. Remplir la moitié du réservoir nettoyé avec de l'eau propre. Mettre le système d'agitation en marche.
3. S'il s'agit d'un mélange en cuve de **SELECT** et de Buctril M pour supprimer à la fois les graminées et les mauvaises herbes à feuilles larges dans le lin (y compris les variétés à basse teneur en acide linoléique), ajouter la quantité requise de Buctril M. Continuer à agiter.
4. Ajouter la quantité requise de **SELECT**. Continuer à agiter.
5. Ajouter la quantité requise de l'adjuvant AMIGO avec le reste de la quantité d'eau nécessaire pour remplir le réservoir.
6. Continuer à agiter ou mettre en marche le système de dérivation.
7. Après chaque interruption de la pulvérisation, bien agiter la bouillie avant de pulvériser à nouveau. Vérifier l'intérieur du réservoir afin de s'assurer que le système d'agitation permet de bien mélanger le reste de la bouillie. Ne pas laisser la bouillie reposer jusqu'au lendemain.
8. Immédiatement après l'utilisation, bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau propre et de détergent.

*Voir la section ÉLIMINATION afin de connaître la marche à suivre pour éliminer la solution de nettoyage.*

## SELECT ET CURTAIL® M

**Lin (y compris les variétés à basse teneur en acide linoléique) :** **SELECT** peut être mélangé en cuve avec CURTAIL M pour supprimer en une seule application certaines mauvaises herbes à feuilles larges et graminées dans le lin. Pulvériser dans au moins 100 L/ha de liquide à une pression de 275 kPa.

Respecter les limites et restrictions et suivre toutes les précautions et recommandations énoncées sur l'étiquette de CURTAIL M, relativement à la période d'application.

**Période d'application :** Le lin peut être traité lorsqu'il atteint une hauteur de 5 à 15 cm. Appliquer lorsque les graminées sont au stade 2 à 6 feuilles et que les mauvaises herbes à feuilles larges sont en pleine croissance. Le traitement contre le chardon des champs devrait être effectué lorsqu'il est entre 10 cm et le stade du pré-bouton. Si les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées indésirables n'atteignent pas en même temps le stade de traitement recommandé, il faut alors faire deux applications séparées.

**Taux d'application :** **SELECT** à raison de 0,19 L/ha, mélangé en cuve avec CURTAIL M à raison de 1,5 à 2,0 L/ha et avec l'adjuvant AMIGO à une concentration de 0,5 % v/v.

**Mauvaises herbes supprimées :** Mauvaises herbes indiquées sur l'étiquette de **SELECT** et mauvaises herbes indiquées sur l'étiquette de CURTAIL M. Consulter l'étiquette du CURTAIL M pour connaître les mauvaises herbes à feuilles larges supprimées.

## Délai d'attente avant le pâturage

Ne pas faucher les cultures traitées pour nourrir le bétail ni laisser le bétail paître dans les champs traités dans les 60 jours suivant l'application.

## INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

1. Bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau et de détergent.
2. Remplir la moitié du réservoir nettoyé avec de l'eau propre. Mettre le système d'agitation en marche.

3. Ajouter la quantité de CURTAIL M requise dans le réservoir. Continuer à agiter.
4. Ajouter la quantité requise de **SELECT**. Continuer à agiter.
5. Ajouter la quantité requise de l'adjuvant AMIGO avec le reste de la quantité d'eau nécessaire pour remplir le réservoir.
6. Continuer à agiter ou mettre en marche le système de dérivation.
7. Après chaque interruption de la pulvérisation, bien agiter la bouillie avant de pulvériser à nouveau. Vérifier l'intérieur du réservoir afin de s'assurer que le système d'agitation permet de bien mélanger le reste de la bouillie. Ne pas laisser la bouillie reposer jusqu'au lendemain. Dans le cas de mélanges en cuve avec des herbicides pour mauvaises herbes à feuilles larges, un dépôt se produira si l'agitation n'est pas continue.
8. Si un film d'huile se forme dans le réservoir, vidanger et nettoyer le réservoir avec une solution détergente puissante.
9. Immédiatement après l'utilisation, bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau propre et de détergent.

### **SELECT ET MCPA ESTER**

**Lin :** **SELECT** peut être mélangé en cuve avec MCPA Ester pour supprimer en une seule application certaines mauvaises herbes à feuilles larges et graminées dans la culture du lin. Pour les applications terrestres, pulvériser dans au moins 100 L/ha de liquide à une pression de 275 kPa. Pour les applications aériennes, appliquer ce mélange en cuve dans un volume de pulvérisation d'au moins 30 L/ha à une pression de 235 kPa.

**NOTE : CE MÉLANGE EN CUVE NE DOIT PAS ÊTRE APPLIQUÉ SUR LES VARIÉTÉS DE LIN À BASSE TENEUR EN ACIDE LINOLÉNIQUE.**

**Période d'application :** Le lin peut être traité lorsqu'il atteint une hauteur de 5 cm jusqu'au début du stade du bouton. Ne pas traiter après le stade du bouton. Appliquer lorsque les graminées sont au stade 2 à 6 feuilles et que les mauvaises herbes à feuilles larges sont au stade de la plantule et en pleine croissance. Si les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées indésirables n'atteignent pas en même temps le stade de traitement recommandé, il faut alors faire deux applications séparées.

**Taux d'application :** **SELECT** à un taux de 0,19 L/ha à 0,38 L/ha, mélangé en cuve avec MCPA ESTER, et avec l'adjuvant AMIGO à une concentration de 0,5 % à 1,0 % v/v.

**Mauvaises herbes supprimées:** Tel qu'indiqué pour **SELECT** utilisé seul et également pour certaines plantules de mauvaises herbes à feuilles larges. Consulter l'étiquette de MCPA ESTER pour connaître le taux d'application, les mauvaises herbes à feuilles larges supprimées et l'information spécifique au lin.

### **INSTRUCTIONS DE MÉLANGE**

1. Bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau et de détergent.
2. Remplir la moitié du réservoir nettoyé avec de l'eau propre. Mettre le système d'agitation en marche.
3. Ajouter la quantité de MCPA ESTER requise dans le réservoir. Continuer à agiter.
4. Ajouter la quantité requise de **SELECT**. Continuer à agiter.
5. Ajouter la quantité requise de l'adjuvant AMIGO avec le reste de la quantité d'eau nécessaire pour remplir le réservoir.
6. Continuer à agiter ou mettre en marche le système de dérivation.
7. Après chaque interruption de la pulvérisation, bien agiter la bouillie avant de pulvériser à nouveau. Vérifier l'intérieur du réservoir afin de s'assurer que le système d'agitation permet de bien mélanger le reste de la bouillie. Ne pas laisser la bouillie reposer jusqu'au lendemain.

8. Immédiatement après l'utilisation, bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau propre et de détergent.

### SELECT ET LONTREL® 360

**Lin (y compris les variétés à basse teneur en acide linoléique) :** SELECT peut être mélangé en cuve avec LONTREL 360 pour supprimer en une seule application certaines mauvaises herbes à feuilles larges et graminées dans le lin. Pulvériser dans au moins 100 L/ha de liquide à une pression de 275 kPa.

Respecter toutes les précautions, restrictions et recommandations portant sur la période d'application, qui figurent sur l'étiquette de LONTREL 360.

**Période d'application :** Le lin peut être traité lorsqu'il atteint une hauteur de 5 à 10 cm. Appliquer lorsque les graminées sont au stade 2 à 6 feuilles et que les mauvaises herbes à feuilles larges sont en pleine croissance. Le traitement contre le chardon des champs devrait être effectué lorsqu'il est entre les stades de la rosette et du pré-bouton. Si les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées indésirables n'atteignent pas en même temps le stade de traitement recommandé, il faut alors faire deux applications séparées.

**Taux d'application :** SELECT à raison de 0,19 L/ha, mélangé en cuve avec LONTREL 360 à raison de 0,56 à 0,83 L/ha et avec l'adjuvant AMIGO à une concentration de 0,5 % v/v.

**Mauvaises herbes supprimées :** Folle avoine, sétaires verte, orge spontanée, blé spontané, avoine spontanée et renouée liseron.

Chardon des champs	0,56 L LONTREL 360/ha	Suppression durant toute la saison
	0,83 L LONTREL 360/ha	Suppression jusqu'à l'année suivante

**INSTRUCTIONS DE MÉLANGE :** Pour connaître les instructions de mélange, consulter la section portant sur le mélange en cuve de SELECT et de LONTREL 360 appliqué dans le canola.

**Canola :** SELECT peut être mélangé en cuve avec LONTREL 360 pour supprimer en une seule application certaines mauvaises herbes à feuilles larges et graminées dans le canola. Pulvériser dans au moins 100 L/ha de solution à une pression de 275 kPa. Respecter toutes les précautions, restrictions et recommandations portant sur la période d'application, qui figurent sur l'étiquette de LONTREL 360.

**Période d'application :** Le canola peut être traité entre les stades 2 et 6 feuilles. Appliquer lorsque les graminées sont entre les stades 2 et 6 feuilles et que les mauvaises herbes à feuilles larges sont en pleine croissance. Le chardon des champs doit être traité lorsqu'il est entre les stades de la rosette et du pré-bouton. Si les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées indésirables n'atteignent pas en même temps le stade de traitement recommandé, il faut alors faire deux applications séparées.

**Taux d'application :** SELECT à raison de 0,19 L/ha, mélangé en cuve avec LONTREL 360 à raison de 0,42 à 0,83 L/ha et avec l'adjuvant AMIGO à une concentration de 0,5 % v/v.

**Mauvaises herbes supprimées :** Folle avoine, sétaires verte, orge spontanée, blé spontané et avoine spontanée.

Renouée liseron	0,56 L LONTREL 360/ha	Suppression durant toute la saison
Chardon des champs	0,42 L LONTREL 360/ha	Suppression des parties aériennes durant 6 à 8 semaines
	0,56 L LONTREL 360/ha	Suppression durant toute la saison
	0,83 L LONTREL 360/ha	Suppression jusqu'à l'année suivante

## INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

1. Bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau et de détergent.
2. Remplir la moitié du réservoir nettoyé avec de l'eau propre. Mettre le système d'agitation en marche.
3. Ajouter la quantité de LONTREL 360 requise dans le réservoir. Continuer à agiter.
4. Ajouter la quantité de **SELECT** requise. Continuer à agiter.
5. Ajouter la quantité de l'adjuvant AMIGO requise avec le reste de la quantité d'eau nécessaire pour remplir le réservoir.
6. Continuer à agiter ou mettre en marche le système de dérivation.
7. Après chaque interruption de la pulvérisation, bien agiter la bouillie avant de pulvériser à nouveau. Vérifier l'intérieur du réservoir afin de s'assurer que le système d'agitation permet de bien mélanger le reste de la bouillie. Ne pas laisser la bouillie reposer jusqu'au lendemain. Dans le cas de mélanges en cuve avec des herbicides pour mauvaises herbes à feuilles larges, un dépôt se produira si l'agitation n'est pas continue.
8. Si un film d'huile se forme dans le réservoir, vidanger et nettoyer le réservoir avec une solution détergente puissante.
9. Immédiatement après l'utilisation, bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau propre et de détergent.

## SELECT ET PURSUIT®

**Pois des champs :** **SELECT** peut être mélangé en cuve avec PURSUIT pour supprimer en une seule application certaines mauvaises herbes à feuilles larges et graminées dans les pois des champs. Appliquer dans au moins 100 litres d'eau par hectare à une pression de 275 kPa. Respecter toutes les précautions, restrictions et recommandations portant sur la période d'application, qui figurent sur l'étiquette de PURSUIT.

**Période d'application :** Les pois des champs peuvent être traités jusqu'au stade 6 feuilles trifoliées. Traiter lorsque le blé spontané, l'orge spontanée, la folle avoine et la sétaires verte sont au stade 2 à 6 feuilles. Appliquer jusqu'au stade 4 feuilles pour supprimer les mauvaises herbes à feuilles larges. Si les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées indésirables n'atteignent pas en même temps le stade de traitement recommandé, il faut alors faire deux applications séparées.

**Taux d'application :** **SELECT** à raison de 0,19 L/ha, mélangé en cuve avec PURSUIT à raison de 210 mL/ha et avec l'adjuvant AMIGO à une concentration de 0,5 % v/v.

**Mauvaises herbes supprimées :** Folle avoine, sétaires verte, orge spontanée, blé spontané ainsi que les mauvaises herbes énumérées sur l'étiquette de PURSUIT.

## INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

1. Bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau et de détergent.
2. Remplir la moitié du réservoir nettoyé avec de l'eau propre. Mettre le système d'agitation en marche.
3. S'il s'agit d'un mélange en cuve de **SELECT** et de PURSUIT pour supprimer à la fois les graminées et les mauvaises herbes à feuilles larges dans les pois des champs, ajouter la quantité requise de PURSUIT. Continuer à agiter.
4. Ajouter la quantité de **SELECT** requise au réservoir. Continuer à agiter.
5. Ajouter la quantité de l'adjuvant AMIGO requise avec le reste de la quantité d'eau nécessaire pour remplir le réservoir.
6. Continuer à agiter ou mettre en marche le système de dérivation.

- Après chaque interruption de la pulvérisation, bien agiter la bouillie avant de pulvériser à nouveau. Vérifier l'intérieur du réservoir afin de s'assurer que le système d'agitation permet de bien mélanger le reste de la bouillie. Ne pas laisser la bouillie reposer jusqu'au lendemain.
- Immédiatement après l'utilisation, bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau propre et de détergent.

**Canola tolérant à l'imazéthapyr (par exemple les variétés de canola possédant le gène SMART) :** SELECT peut être mélangé en cuve avec PURSUIT pour supprimer en une seule application certaines mauvaises herbes à feuilles larges et graminées dans les variétés de canola tolérantes à l'imazéthapyr. Appliquer dans au moins 100 litres d'eau par hectare à une pression de 275 kPa. Respecter toutes les précautions, restrictions et recommandations portant sur la période d'application, qui figurent sur l'étiquette de PURSUIT.

**Période d'application :** Les variétés de canola tolérantes à l'imazéthapyr peuvent être traitées après que la culture a développé une feuille complète. Traiter lorsque les graminées sont au stade 2 à 6 feuilles. Appliquer jusqu'au stade 4 feuilles pour la suppression des mauvaises à feuilles larges.

**Taux d'application :** SELECT à raison de 0,19 L/ha, mélangé en cuve avec PURSUIT à raison de 0,105 ou de 0,21 L/ha et avec l'adjuvant AMIGO à une concentration de 0,5 % v/v.

**Mauvaises herbes supprimées :** Tel qu'indiqué pour SELECT en plus des mauvaises herbes qui suivent.

PURSUIT à raison de 0,105 L/ha pour supprimer : stellaire moyenne, ortie royale, amarante à racine rouge\*, tabouret des champs, canola spontané (non tolérant à l'imazéthapyr), moutarde des champs et renouée liseron\*, au stade 1 à 4 feuilles.

\*Pour les faibles degrés d'infestation seulement. Pour les degrés d'infestation élevés, utiliser PURSUIT à raison de 0,21 L/ha.

PURSUIT à raison de 0,21 L/ha pour la suppression des mauvaises herbes énumérées sur l'étiquette de PURSUIT.

**INSTRUCTIONS DE MÉLANGE :** Consulter la section des mélanges en cuve avec SELECT et PURSUIT appliqués dans les pois des champs.

## SELECT ET MUSTER®

**Canola :** SELECT peut être mélangé en cuve avec MUSTER pour supprimer en une seule application certaines mauvaises herbes à feuilles larges et graminées dans le canola. Pulvériser dans au moins 100 L/ha d'eau à une pression de 275 kPa. Bien suivre les précautions, restrictions et recommandations portant sur la période d'application, qui figurent sur l'étiquette de MUSTER.

**Période d'application :** Le canola peut être traité à partir du stade 2 feuilles jusqu'à l'apparition des boutons floraux. Pulvériser lorsque les graminées sont aux stades 2 à 6 feuilles et lorsque les mauvaises herbes à feuilles larges sont entre les stades du cotylédon et 6 feuilles. Si les mauvaises herbes à feuilles larges et les graminées indésirables n'atteignent pas en même temps le stade de traitement recommandé, il faut alors faire deux applications séparées.

**Taux d'application :** SELECT à raison de 0,19 L/ha, mélangé en cuve avec MUSTER à raison de 20 ou 30 g/ha et avec l'adjuvant AMIGO à une concentration de 0,5 % v/v.

**Mauvaises herbes supprimées :**

**MUSTER à raison de 20 ou 30 g/ha :** folle avoine, sétaires verte, orge spontanée, avoine spontanée, blé spontané, ortie royale, moutarde des champs, renouée scabre, sagesse-des-chirurgiens (plantules printaniers), tabouret des champs\* et amarante à racine rouge.

\*Répression du tabouret des champs au taux réduit. Appliquer sur le tabouret des champs au stade 1 à 4 feuilles.



## INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

1. Bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau et de détergent.
2. Remplir la moitié du réservoir nettoyé avec de l'eau propre. Mettre le système d'agitation en marche.
3. Ajouter la quantité de MUSTER requise au réservoir. Continuer à agiter.
4. Aussitôt que le MUSTER est en suspension, ajouter la quantité de **SELECT** requise au réservoir. Continuer à agiter.
5. Ajouter la quantité de l'adjuvant AMIGO requise avec le reste de la quantité d'eau nécessaire pour remplir le réservoir.
6. Continuer à agiter ou mettre en marche le système de dérivation.
7. Pour des remplissages répétés, préparer une bouillie de MUSTER et ajouter le volume d'eau nécessaire dans le réservoir du pulvérisateur avant d'ajouter **SELECT** et AMIGO.
8. Après chaque interruption de la pulvérisation, bien agiter la bouillie avant de pulvériser à nouveau. Vérifier l'intérieur du réservoir afin de s'assurer que le système d'agitation permet de bien mélanger le reste de la bouillie. Ne pas laisser la bouillie reposer jusqu'au lendemain.
9. Immédiatement après l'emploi, consulter l'étiquette de MUSTER pour obtenir les directives de nettoyage approprié du réservoir.

## **SELECT ET LIBERTY® 150 SN – PROVINCES DES PRAIRIES ET RÉGION DE LA RIVIÈRE DE LA PAIX EN COLOMBIE-BRITANNIQUE SEULEMENT** **Canola : Pour utilisation seulement sur les variétés de canola tolérantes au glufosinate-ammonium (p. ex., variétés ou hybrides appelés LIBERTYLINK).**

**SELECT** peut être mélangé en cuve avec l'herbicide LIBERTY 150 SN pour supprimer en une seule application certaines mauvaises herbes à feuilles larges et graminées dans les variétés de canola tolérantes au glufosinate-ammonium. Pour les applications terrestres, appliquer dans un volume de pulvérisation d'au moins 110 L/ha à une pression de 275 kPa. Pour les applications aériennes, appliquer ce mélange en cuve dans un volume de pulvérisation d'au moins 55 L/ha à une pression de 300 kPa.

Respecter toutes les précautions, restrictions et recommandations portant sur la période d'application, qui figurent sur l'étiquette de l'herbicide LIBERTY 150 SN.

**Période d'application :** Les variétés de canola tolérantes au glufosinate-ammonium peuvent être traitées à partir du stade du cotylédon jusqu'au début du stade de la montaison. Traiter lorsque la folle avoine, le blé spontané, l'avoine spontanée et la sétaire verte sont au stade 1 à 5 feuilles. Consulter l'étiquette de l'herbicide LIBERTY 150 SN pour connaître la période d'application aux taux de 2,67 ou de 4,0 L/ha sur toutes les autres graminées et mauvaises herbes à feuilles larges.

**Taux d'application :** **SELECT** à raison de 63 mL/ha mélangé en cuve avec l'herbicide LIBERTY 150 SN à raison de 2,67 à 4,0 L/ha et avec l'adjuvant AMIGO à une concentration de 0,5 % v/v.

**Mauvaises herbes supprimées :** Folle avoine, sétaire verte, orge spontanée, blé spontané et avoine spontanée, en plus des autres graminées et mauvaises herbes à feuilles larges indiquées sur l'étiquette de l'herbicide LIBERTY 150 SN, aux taux de 2,67 et de 4,0 L/ha.

## INSTRUCTIONS DE MÉLANGE

1. Bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau et de détergent.
2. Remplir la moitié du réservoir nettoyé avec de l'eau propre. Mettre le système d'agitation en marche.
3. Verser la quantité appropriée d'adjuvant AMIGO dans le réservoir. Continuer à agiter jusqu'à ce que la bouillie soit bien mélangée.
4. ARRÊTER l'agitation. Verser la quantité requise d'herbicide LIBERTY 150 SN dans le réservoir. Mettre le système d'agitation en marche.

5. Verser la quantité de **SELECT** requise et le reste d'eau nécessaire pour remplir le réservoir.
6. Continuer à agiter ou mettre en marche le système de dérivation et pulvériser immédiatement.
7. Après chaque interruption de la pulvérisation, bien agiter la bouillie avant de pulvériser à nouveau. Vérifier l'intérieur du réservoir afin de s'assurer que le système d'agitation permet de bien mélanger le reste de la bouillie. Ne pas laisser la bouillie reposer jusqu'au lendemain. Dans le cas de mélanges en cuve avec des herbicides pour mauvaises herbes à feuilles larges, un dépôt se produira si l'agitation n'est pas continue.
8. Si un film d'huile se forme dans le réservoir, vidanger et nettoyer le réservoir avec une solution détergente puissante.
9. Immédiatement après l'utilisation, bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau propre et de détergent.

## **SELECT ET LIBERTY 200 SN – EST DU CANADA ET COLOMBIE-BRITANNIQUE SEULEMENT**

**Canola :** Pour utilisation seulement sur les variétés de canola tolérantes au glufosinate-ammonium (p. ex., variétés ou hybrides appelés LIBERTYLINK).

**SELECT** peut être mélangé en cuve avec l'herbicide LIBERTY 200 SN pour supprimer en une seule application certaines mauvaises herbes à feuilles larges et graminées dans les variétés de canola tolérantes au glufosinate-ammonium. Appliquer dans un volume de pulvérisation d'au moins 110 L/ha à une pression de 275 kPa. Respecter toutes les précautions, restrictions et recommandations portant sur la période d'application, qui figurent sur l'étiquette de l'herbicide LIBERTY 200 SN.

**Période d'application :** Les variétés de canola tolérantes au glufosinate-ammonium peuvent être traitées à partir du stade du cotylédon jusqu'au début du stade de la montaison. Traiter lorsque la folle avoine, le blé spontané, l'avoine spontanée et la sétaires verte sont au stade 1 à 5 feuilles. Consulter l'étiquette de l'herbicide LIBERTY 200 SN pour connaître la période d'application aux taux de 2,0 ou de 2,5 L/ha sur toutes les autres graminées et mauvaises herbes à feuilles larges.

**Taux d'application :** **SELECT** à raison de 63 mL/ha mélangé en cuve avec l'herbicide LIBERTY 200 SN à raison de 2,0 à 2,5 L/ha et avec l'adjuvant AMIGO à une concentration de 0,5 % v/v.

**Mauvaises herbes supprimées :** Folle avoine, sétaires verte, orge spontanée, blé spontané et avoine spontanée, en plus des autres graminées et mauvaises herbes à feuilles larges indiquées sur l'étiquette de l'herbicide LIBERTY 200 SN, aux taux de 2,0 et de 2,5 L/ha.

## **INSTRUCTIONS DE MÉLANGE**

1. Bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau et de détergent.
2. Remplir la moitié du réservoir nettoyé avec de l'eau propre. Mettre le système d'agitation en marche.
3. Verser la quantité d'adjuvant AMIGO requise dans le réservoir. Continuer à agiter jusqu'à ce que la bouillie soit bien mélangée.
4. ARRÊTER l'agitation. Verser la quantité requise d'herbicide LIBERTY 200 SN dans le réservoir. Mettre le système d'agitation en marche.
5. Verser la quantité de **SELECT** requise et le reste d'eau nécessaire pour remplir le réservoir.
6. Continuer à agiter ou mettre en marche le système de dérivation et pulvériser immédiatement.
7. Après chaque interruption de la pulvérisation, bien agiter la bouillie avant de pulvériser à nouveau. Vérifier l'intérieur du réservoir afin de s'assurer que le système d'agitation permet de bien mélanger le reste de la bouillie. Ne pas laisser la bouillie reposer jusqu'au lendemain. Dans le cas de mélanges en cuve avec des herbicides pour mauvaises herbes à feuilles larges, un dépôt se produira si l'agitation n'est pas continue.
8. Si un film d'huile se forme dans le réservoir, vidanger et nettoyer le réservoir avec une solution détergente puissante.
9. Immédiatement après l'utilisation, bien nettoyer le pulvérisateur en rinçant tout l'équipement de pulvérisation avec une solution d'eau propre et de détergent.

**AVIS À L'UTILISATEUR :****LIRE CE QUI SUIT AVANT D'APPLIQUER CE PRODUIT POUR L'USAGE SPÉCIAL INDIQUÉ :**

Le **MODE D'EMPLOI** de ce produit pour le ou les usages spéciaux décrits ci-dessous a été rédigé par des personnes autres qu'Arysta LifeScience et est homologué par Santé Canada dans le cadre du Programme d'extension du profil d'emploi pour les usages limités demandés par les utilisateurs. Arysta LifeScience ne formule aucune allégation ni n'offre aucune garantie concernant l'efficacité du produit ou la tolérance des cultures (phytotoxicité) lorsque ce produit est employé sur les cultures figurant ci-dessous. En foi de quoi l'acheteur et l'utilisateur assument tous les risques relatifs à l'efficacité du produit et à la tolérance des cultures, et ils acceptent de dégager Arysta LifeScience de toute responsabilité liée à des réclamations relatives à l'efficacité ou à la phytotoxicité du produit lorsque celui-ci est appliqué aux fins des usages décrits ci-dessous.

Culture	Mauvaises herbes supprimées	Taux d'application :		Observations
		de SELECT	d'AMIGO	
<b>LES PRAIRIE CARNATION</b>	Mauvaises herbes annuelles indiquées sur l'étiquette de <b>SELECT</b> . Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux de cette étiquette.	0,19 L/ha	0,5 % v/v	<b>PÉRIODE D'APPLICATION :</b> Appliquer <b>SELECT</b> après la levée des mauvaises herbes et de la culture. Faire un maximum d'une application par année avec de l'équipement terrestre. Appliquer dans un volume de pulvérisation d'au moins 110 L/ha. Ne pas récolter les Prairie Carnation traités destinés à la consommation humaine. <b>Application terrestre seulement.</b>

AVIS À L'UTILISATEUR : (a continué)

Culture	Mauvaises herbes supprimées	Taux d'application :		Observations
		de SELECT	d'AMIGO	
<p><b>Edamame Et Légumineuses à gousse comestible (sous-groupe de culture 6A)</b> : Haricot (<i>Phaseolus</i> spp., y compris le haricot d'Espagne, le haricot vert et le haricot jaune); Dolique (<i>Vigna</i> spp., y compris le dolique asperge et le haricot papillon); Pois sabre (<i>Canavalia ensiformis</i>); Pois (<i>Pisum</i> spp., y compris le pois nain, le pois à gousse comestible, le pois mange-tout et le pois sugar snap); Pois cajan (<i>Cajanus cajan</i>); Soja (graines immatures) (<i>Glycine max</i>); Pois sabre (<i>Canavalia gladiata</i>).</p> <p><b>Légumineuses vertes à écosser (sous-groupe de culture 6B)</b> : Haricot (<i>Phaseolus</i> spp., y compris le haricot de Lima); Dolique à œil noir (<i>Vigna</i> spp.); Gourgane (fève des marais) (<i>Vicia faba</i>); Pois (<i>Pisum</i> spp., y compris le petit pois anglais, le petit pois de jardin et le petit pois vert); Pois cajan (<i>Cajanus cajan</i>).</p>	<p>Graminées retrouvées sur l'étiquette de <b>SELECT</b>. Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux de cette étiquette.</p>	0,19 L/ha	0,5 % v/v	<p>Appliquer <b>SELECT</b> en post-levée des mauvaises herbes et de la culture. Faire un maximum d'une application par année avec de l'équipement terrestre.</p> <p>Appliquer dans un volume de pulvérisation d'au moins 110 L d'eau/ha.</p> <p>Respecter un DAAR de 21 jours.</p> <p>Application terrestre seulement.</p>

AVIS À L'UTILISATEUR : (a continué)

Culture	Mauvaises herbes supprimées	Taux d'application :		Observations
		de SELECT	d'AMIGO	
<b>CERISE (DOUCE ET ACIDE)</b>	Graminées indiquées sur l'étiquette. Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux de cette étiquette.	0,19 à 0,38 L/ha	0,5 à 1,0 % v/v	<p><b>PÉRIODE D'APPLICATION :</b> Appliquer <b>SELECT</b> aux cerisiers (douces et acides) et après la levée des mauvaises herbes. Ne pas appliquer <b>SELECT</b> directement au sommet des cerisiers. Orienter le jet à la base des arbres où les graminées poussent. Une application inappropriée de <b>SELECT</b> risque d'endommager la culture.</p> <p>Faire un maximum d'une application par année avec de l'équipement terrestre.</p> <p>Appliquer dans un volume de pulvérisation d'au moins 110 L/ha.</p> <p>Respecter un DAAR de 14 jours.</p> <p>Application terrestre seulement.</p>
<b>BLEUET EN CORYMBE</b>	Graminées indiquées sur l'étiquette de <b>SELECT</b> . Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux de cette étiquette.	0,19 à 0,38 L/ha	0,5 à 1,0 % v/v	<p><b>PÉRIODE D'APPLICATION :</b> Appliquer <b>SELECT</b> après la levée des mauvaises herbes et de la culture.</p> <p>Faire un maximum d'une application par année, en postlevée, avec de l'équipement terrestre.</p> <p>Appliquer en un traitement généralisé dirigé vers le sol.</p> <p>Appliquer dans un volume de pulvérisation d'au moins 100 L/ha.</p> <p>Respecter un DAAR de 14 jours.</p> <p><b>Application terrestre seulement.</b></p>

AVIS À L'UTILISATEUR : (a continué)

Culture	Mauvaises herbes supprimées	Taux d'application :		Observations
		de SELECT	d'AMIGO	
<b>CORIANDRE, CARVI</b>	Mauvaises herbes annuelles indiquées sur l'étiquette. Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux de cette étiquette.	0,19 à 0,38 L/ha Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux pour <b>SELECT</b> + <b>AMIGO</b> de cette étiquette.	0,5 à 1,0 % v/v Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux pour <b>SELECT</b> + <b>AMIGO</b> de cette étiquette.	<b>PÉRIODE D'APPLICATION :</b> Appliquer <b>SELECT</b> après la levée des mauvaises herbes et de la culture. Faire un maximum d'une application par année avec de l'équipement terrestre. Respecter un DAAR de 30 jours pour les feuilles et de 60 jours pour les graines. <b>Application terrestre seulement.</b>
<b>ANETH</b>	Graminées indiquées sur l'étiquette. Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux de cette étiquette.	0,19 à 0,38 L/ha	0,5 à 1,0 % v/v	<b>PÉRIODE D'APPLICATION :</b> Appliquer <b>SELECT</b> après la levée des mauvaises herbes et la culture lorsque l'aneth est au stade 3 à 5 feuilles. Faire un maximum d'une application par année avec de l'équipement terrestre. Respecter un DAAR de 30 jours pour les feuilles et de 40 jours pour les graines. <b>Application terrestre seulement.</b>
<b>CIBOULETTE</b>	Graminées indiquées sur l'étiquette. Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux de cette étiquette.	0,19 à 0,38 L/ha Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux pour <b>SELECT</b> + <b>AMIGO</b> de cette étiquette.	0,5 à 1,0 % v/v Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux pour <b>SELECT</b> + <b>AMIGO</b> de cette étiquette.	<b>PÉRIODE D'APPLICATION :</b> Faire un maximum d'une application par année avec de l'équipement terrestre. Appliquer dans un volume de pulvérisation d'au moins 110 L/ha. Respecter un DAAR de 30 jours. <b>Application terrestre seulement.</b>

**AVIS À L'UTILISATEUR : (a continué)**

Culture	Mauvaises herbes supprimées	Taux d'application :		Observations
		de SELECT	d'AMIGO	
Angélique, mélisse, basilic, bourrache, pimprenelle, camomille, cataire, cerfeuil, sauge sclarée, balsamite, coriandre du Mexique (feuille), marrube, hysope, lavande, livèche, souci officinal, origan (y compris la marjolaine, l'origan et l'origan de Chypre), capucine, persil séché, menthe pouliot, romarin, rue, sauge, sarriette (jardins et montagnes), laurier (lauriersauce), tanaïsie, estragon, thym, thé des bois, aspérule odorante et absinthe	Graminées indiquées sur l'étiquette. Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux de cette étiquette.	0,19 L/ha	0,5 % v/v	<p><b>PÉRIODE D'APPLICATION :</b> Appliquer <b>SELECT</b> après la levée des mauvaises herbes et la culture.</p> <p>Faire un maximum d'une application par année avec de l'équipement terrestre.</p> <p>Appliquer en un traitement généralisé dirigé vers le sol.</p> <p>Appliquer dans un volume de pulvérisation d'au moins 110 L/ha.</p> <p>Respecter un DAAR de 30 jours.</p> <p><b>Application terrestre seulement.</b></p>
Anis (graine), nigelle, céleri (graine), coriandre du Mexique (graine), carvi commun, fenouil [fenouil et fenouil de Florence (graine)], baie de genévrier, livèche (graine) moutarde (graine), pavot (graine) et safran	Graminées indiquées sur l'étiquette. Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux de cette étiquette.	0,19 L/ha	0,5 % v/v	<p><b>PÉRIODE D'APPLICATION :</b> Appliquer <b>SELECT</b> après la levée des mauvaises herbes et la culture.</p> <p>Faire un maximum d'une application par année avec de l'équipement terrestre.</p> <p>Appliquer en un traitement généralisé dirigé vers le sol.</p> <p>Appliquer dans un volume de pulvérisation d'au moins 110 L/ha.</p> <p>Respecter un DAAR de 60 jours.</p> <p><b>Application terrestre seulement.</b></p>

AVIS À L'UTILISATEUR : (a continué)

Culture	Mauvaises herbes supprimées	Taux d'application :		Observations
		de SELECT	d'AMIGO	
<b>HOUBLON</b>	Graminées indiquées sur l'étiquette. Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux de cette étiquette.	0,19 à 0,38 L/ha	0,5 à 1,0 % v/v	<p><b>PÉRIODE D'APPLICATION :</b> Appliquer <b>SELECT</b> après la levée des mauvaises herbes et la culture.</p> <p>Faire un maximum d'une application par année avec de l'équipement terrestre.</p> <p>Appliquer en un traitement généralisé dirigé vers le sol.</p> <p>Appliquer dans un volume de pulvérisation d'au moins 110 L/ha.</p> <p>Respecter un DAAR de 21 jours.</p> <p><b>Application terrestre seulement.</b></p>
<b>FENUGREC</b>	Mauvaises herbes annuelles indiquées sur l'étiquette de <b>SELECT</b> .	Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux pour <b>SELECT + AMIGO</b> de cette étiquette.	Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux pour <b>SELECT + AMIGO</b> de cette étiquette.	<p><b>PÉRIODE D'APPLICATION :</b> Appliquer <b>SELECT</b> après la levée lorsque le fenugrec est au stade 3 à 5 feuilles.</p> <p>Faire un maximum d'une application par saison, avec de l'équipement terrestre.</p> <p>Appliquer dans un volume de pulvérisation d'au moins 100 L/ha.</p> <p>Respecter un DAAR de 30 jours.</p> <p><b>Application terrestre seulement.</b></p>
<b>OIGNONS SECS, ÉCHALOTE, BULBE ET L'AIL</b>	Mauvaises herbes annuelles retrouvées sur l'étiquette de <b>SELECT</b> .	0.19 - 0,38 L/ha	0,5 % v/v	<p><b>PÉRIODE D'APPLICATION :</b> Appliquer <b>SELECT</b> après la levée lorsque la culture est au stade 1 à 4 feuilles.</p> <p>Faire un maximum d'une application par saison, avec de l'équipement terrestre.</p> <p>Respecter un DAAR de 45 jours.</p> <p><b>Application terrestre seulement.</b></p>



AVIS À L'UTILISATEUR : (a continué)

Culture	Mauvaises herbes supprimées	Taux d'application :		Observations
		de SELECT	d'AMIGO	
<b>CARTHAME</b>	Mauvaises herbes annuelles indiquées sur l'étiquette de <b>SELECT</b> .	0,19 à 0,38 L/ha	0,5 à 1,0 % v/v	<p><b>PÉRIODE D'APPLICATION :</b></p> <p>Appliquer <b>SELECT</b> après la levée lorsque le carthame est au stade 6 à 8 feuilles.</p> <p>Faire un maximum d'une application par année, avec de l'équipement terrestre.</p> <p>Appliquer dans un volume de pulvérisation d'au moins 100 L d'eau/ha.</p> <p>Respecter un DAAR de 70 jours.</p> <p><b>Application terrestre seulement.</b></p>
<b>ÉPINARD</b>	Mauvaises herbes annuelles indiquées sur l'étiquette de <b>SELECT</b> .	Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux pour <b>SELECT + AMIGO</b> de cette étiquette.	Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux pour <b>SELECT + AMIGO</b> de cette étiquette.	<p><b>PÉRIODE D'APPLICATION :</b></p> <p>Faire un maximum de deux applications par année à 14 jours d'intervalle, après la levée, avec de l'équipement terrestre, lorsque les graminées sont au stade 2 à 6 feuilles.</p> <p>Respecter un DAAR de 14 jours.</p> <p><b>Application terrestre seulement.</b></p>
<b>CANNEBERGE</b>	Graminées indiquées sur l'étiquette. Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux de cette étiquette.	0,19 à 0,38 L/ha	0,5 à 1,0 % v/v	<p><b>PÉRIODE D'APPLICATION :</b> Appliquer <b>SELECT</b> après la levée des mauvaises herbes et de la culture. Ne pas appliquer entre le stade de la crosse et la pleine floraison.</p> <p>Faire un maximum d'une application par année avec de l'équipement terrestre.</p> <p>Appliquer dans un volume de pulvérisation d'au moins 110 L d'eau/ha.</p> <p>Respecter un DAAR de 30 jours.</p>

**AVIS À L'UTILISATEUR : (a continué)**

Culture	Mauvaises herbes supprimées	Taux d'application :		Observations
		de SELECT	d'AMIGO	
<b>BETTERAVE ROUGE, PANAIS, CAROTTES, RADIS</b>	Graminées indiquées sur l'étiquette. Consulter le tableau des mauvaises herbes/taux de cette étiquette.	0,19 à 0,38 L/ha	0,5 à 1,0 % v/v	<p><b>PÉRIODE D'APPLICATION :</b> Appliquer <b>SELECT</b> après la levée des mauvaises herbes et de la culture avec de l'équipement terrestre.</p> <p>Faire un maximum de deux applications par année. Si une autre application est nécessaire, prévoir au moins 14 jours entre la première et la seconde application.</p> <p>Ne pas appliquer plus de 0,38 L/ha (90 grammes m.a./ha) par saison de croissance.</p> <p>Appliquer dans un volume de pulvérisation d'au moins 110 L d'eau/ha.</p> <p>Respecter un DAAR de 30 jours.</p> <p><b>Application terrestre seulement.</b></p>

**INSTRUCTIONS DE PULVÉRISATION :**

**APPLICATION TERRESTRE**

**Volume d'eau et pression de pulvérisation :**

Pour une application terrestre, utiliser un pulvérisateur muni de buses à jet plat. Pour obtenir une couverture optimale, utiliser des buses inclinées vers l'avant à 45 degrés.

L'utilisation de buses à miroir ou à jet en cône creux n'est pas recommandée en raison d'une couverture inégale et inadéquate. Une pulvérisation uniforme complète de toute la surface foliaire des mauvaises herbes visées est nécessaire afin d'obtenir une suppression optimale des mauvaises herbes.

Bien nettoyer tous les filtres afin de prévenir l'obstruction des buses, surtout lorsque les volumes de pulvérisation sont de 55 à 110 L/ha.

Pour les applications terrestres, utiliser des volumes de pulvérisation variant de 55 à 225 L/ha et une pression minimale de 275 kPa.

Pour traiter des populations élevées de mauvaises herbes ou lorsque le couvert végétal des cultures est dense, utiliser un volume de pulvérisation minimum de 110 litres par hectare et une pression de 275 à 425 kPa. En toute circonstance, respecter le taux d'application d'AMIGO recommandé sur l'étiquette, à la section TAUX D'APPLICATION DE **SELECT**.

**Pour les graines vertes ou sèches de légumineuses (sauf le soja) et edamame, un volume de pulvérisation minimum de 110 L/ha est recommandé.**

## APPLICATION AÉRIENNE

### Volume d'eau et pression de pulvérisation :

Appliquer **SELECT** seul ou dans des mélanges en cuve (SEULEMENT avec les produits d'association recommandés homologués pour l'application aérienne) dans un volume de pulvérisation d'au moins 28 L/ha à une pression d'au moins 300 kPa.

Épandre seulement avec un avion ou un hélicoptère réglé et étalonné pour être utilisé dans les conditions atmosphériques de la région et selon les taux et directives figurant sur l'étiquette.

Les précautions à prendre ainsi que les directives et taux d'épandage à respecter sont propres au produit. Lire attentivement l'étiquette et s'assurer de bien la comprendre avant d'ouvrir le contenant. Utiliser seulement les quantités recommandées qui sont indiquées sur l'étiquette.

Lors d'une application aérienne de **SELECT**, s'assurer que l'épandage est uniforme. Afin d'éviter que le produit ne soit épandu de façon non uniforme (épandage en bandes, irrégulier ou double), utiliser des marqueurs appropriés.

### Mises en garde concernant l'utilisation – Application aérienne

- Lire attentivement l'étiquette au complet et bien la comprendre avant d'ouvrir le contenant. Pour toute question, appeler Arysta LifeScience North America, LLC, au 1-866-761-9397. Pour obtenir des conseils techniques contacter le distributeur ou un conseiller agricole provincial.
- Épandre seulement quand les conditions météorologiques à l'endroit traité permettent une couverture complète et uniforme de la culture visée. Les conditions favorables spécifiques à l'épandage aérien décrites dans le Guide national d'apprentissage-application de pesticides par aéronef développé par le Comité fédéral, provincial et territorial sur la lutte antiparasitaire et les pesticides doivent être présentes.
- Ne pas appliquer sur un terrain présentant un risque de ruissellement de surface jusqu'à des systèmes aquatiques.
- Ne pas épandre de pesticides sur les étendues d'eau. Éviter que la dérive n'atteigne une étendue d'eau ou tout autre endroit non visé. Les zones tampons indiquées devraient être respectées.
- Ne pas épandre par temps mort ou lorsque la vitesse du vent et son orientation peuvent provoquer une dérive.
- Ne pas appliquer lorsque le vent souffle à plus de 16 km/h à hauteur de vol au lieu de l'application.
- Ne pas appliquer avec des gouttelettes de pulvérisation plus petites que ce que prévoit la classification moyenne de l'ASAE.

### Mise en garde concernant l'opérateur antiparasitaire – Application aérienne

- Ne pas permettre au pilote de mélanger les produits chimiques qui seront embarqués à bord de l'appareil. Il peut toutefois charger des produits chimiques prémélangés contenus dans un système fermé.
- Il serait préférable que le pilote puisse établir une communication à chaque emplacement traité au moment de l'épandage.
- Le personnel au sol de même que les personnes qui s'occupent des mélanges et du chargement doivent porter des lunettes protectrices ou un écran facial, un tablier de caoutchouc, des gants résistant aux produits chimiques, des bottes de caoutchouc, une chemise à manches longues et un pantalon long.
- Tout le personnel doit se laver les mains et le visage à grande eau avant de manger et de boire. Les vêtements protecteurs, le cockpit de l'avion et les cabines des véhicules doivent être décontaminés régulièrement.

### Mises en garde propres au produit

- Lire attentivement l'étiquette au complète et bien la comprendre avant d'ouvrir le contenant. Pour toute question, appeler le fabricant au 1-866-761-9397. Pour obtenir des conseils techniques contacter le distributeur ou un conseiller agricole provincial.

**NE PAS** appliquer lors de périodes de calme plat et éviter d'appliquer ou lorsque le vent souffle en rafales.

**NE PAS** appliquer lorsque le vent souffle à plus de 16 km/h à hauteur de vol au lieu de l'application.

**NE PAS** appliquer avec des gouttelettes de pulvérisation plus petites que ce que prévoit la classification moyenne de l'American Society of Agricultural Engineers (ASAE). Afin de réduire la dérive causée par les turbulences créées en bout d'aile de l'aéronef, l'espacement des buses le long de la rampe d'aspersion **NE DOIT PAS** dépasser 65 % de l'envergure des ailes ou du rotor.

### Zones tampons :

Les zones tampons spécifiées dans le tableau ci-dessous sont requises entre le point d'application directe et la lisière la plus proche, dans la direction du vent, des habitats terrestres sensibles (tels que prairies, forêts, brise-vent, terres à bois, haies, zones riveraines et zones arbustives).

Méthode d'application	Culture	Zone tampon (mètres) pour protéger un habitat terrestre :	
Pulvérisateur agricole	Toutes les cultures	15	
Voie aérienne	Canola, pois des champs, lin, lentilles, moutarde orientale, moutarde blanche, <i>Brassica carinata</i> , pommes de terre, soja, tournesol	Avion	20
		Hélicoptère	20
	Haricot ( <i>Lupinus</i> spp.) (y compris le lupin-grain, le lupin doux, le lupin blanc et le lupin blanc doux); haricot ( <i>Phaseolus</i> spp.) (y compris le haricot de grande culture, le haricot commun, le haricot de Lima (sec), le petit haricot blanc, le haricot pinto et le haricot tépary); haricot ( <i>Vigna</i> spp.) (y compris l'adzuki, le dolique à œil noir, le dolique mongette, le haricot papillon, le haricot mungo, le pois zombi et le haricot mungo noir); gourgane (fève des marais) ( <i>Vicia faba</i> ) : pois chiche ( <i>Cicer arietinum</i> ); guar ( <i>Cyamopsis tetragonoloba</i> ); dolique d'Égypte ( <i>Lablab purpureus</i> ); lentille ( <i>Lens esculenta</i> ); pois ( <i>Pisum</i> spp.) (y compris le pois des champs); pois cajan sec ( <i>Cajanus cajan</i> ),,	Avion	15
		Hélicoptère	15

### Cerise (douce et acide) :

L'utilisation des méthodes ou d'équipement de pulvérisation suivants NE requiert PAS une zone tampon : pulvérisateur manuel ou à réservoir dorsal et traitement localisé, pulvérisateur intercalaire à écrans protecteurs ou capuchon faible garde au sol ou pulvérisateurs blindés qui assurent la dérive de pulvérisation ne sont pas en contact avec les fruits du verger des cultures ou le feuillage.

Lorsqu'un mélange en cuve est utilisé, consulter les étiquettes des produits d'association et respecter la zone tampon la plus grande (la plus restrictive) parmi tous les produits utilisés dans le mélange en cuve et pulvériser en utilisant la catégorie de gouttelettes la plus grosse (ASAE) indiquée sur les étiquettes de ces produits d'association.

## RESTRICTIONS ET LIMITATIONS

1. Utiliser seulement sur les cultures indiquées sur l'étiquette.
2. Un bon travail du sol est requis avant le semis dans un champ où l'on a cultivé des plantes fourragères ou des graminées l'année précédente.
3. Prendre les précautions nécessaires afin d'éviter que les bandes de pulvérisation ne se chevauchent.
4. L'efficacité du traitement est réduite s'il pleut dans l'heure suivant l'application.
5. Ne pas mélanger ni appliquer l'herbicide de postlevée **SELECT** concentré émulsifiable avec tout autre adjuvant, pesticide ou engrais, sauf si on le recommande spécifiquement sur l'étiquette.
6. Attendre 4 jours entre un traitement avec **SELECT** et l'application de tout autre produit agrochimique qui n'est pas recommandé sur l'étiquette dans les mélanges en cuve.
7. Ne pas appliquer plus de 0,38 L/ha (90 grammes m.a./ha) par saison.
8. Après une application de **SELECT**, ne pas faire paître les animaux ni les nourrir avec du fourrage vert avant que l'intervalle de temps approprié, tel qu'indiqué dans le tableau des recommandations sur les cultures, ne se soit écoulé. Ne pas faucher comme fourrage les récoltes traitées avant que l'intervalle de temps approprié, tel qu'indiqué dans le tableau des recommandations sur les cultures, ne se soit écoulé.
9. **SELECT** peut être appliqué par voie aérienne sur certaines cultures mentionnées dans la présente étiquette.
10. NE PAS retourner ni permettre le retour des travailleurs dans la zone traitée durant le délai de sécurité (DS) de 12 heures.

## RECOMMANDATIONS SUR LA GESTION DE LA RÉSISTANCE

Gestion de la résistance, **SELECT** est un herbicide du groupe 1. Toute population de mauvaises herbes peut renfermer ou former des plantes naturellement résistantes à **SELECT** et à d'autres herbicides du groupe 1. Les biotypes résistants peuvent finir par prédominer au sein de la population si ces herbicides sont utilisés de façon répétée dans un champ. Il peut exister d'autres mécanismes de résistance sans lien avec le site ou le mode d'action, mais qui sont spécifiques à des composés chimiques, comme un métabolisme accru. Il est recommandé de suivre des stratégies appropriées de gestion de la résistance.

Pour retarder l'acquisition de la résistance aux herbicides :

- Dans la mesure du possible, alterner **SELECT** ou les autres herbicides du groupe 1 avec des herbicides appartenant à des groupes différents capables de supprimer les mêmes mauvaises herbes au champ.
- Utiliser des mélanges en cuve contenant des herbicides provenant d'un groupe différent, si cet emploi est permis.
- Utiliser les herbicides dans le cadre d'un programme de lutte intégrée comprenant des inspections sur le terrain, des relevés d'utilisations antérieures de pesticides et de la rotation des cultures et faisant place à la possibilité d'intégrer des pratiques de labour (ou d'autres méthodes mécaniques) ou des pratiques de lutte culturale, biologique et d'autres formes de lutte chimique.
- Inspecter les populations de mauvaises herbes traitées pour y découvrir les signes de l'acquisition d'une résistance.

- Empêcher la propagation à d'autres champs des mauvaises herbes résistantes en nettoyant le matériel de labour et de récolte et en utilisant des semences non contaminées.
- Pour des cultures précises ou des biotypes de mauvaises herbes précis, s'adresser au spécialiste local des interventions sur le terrain ou à un conseiller agréé pour toute autre recommandation relative à la gestion de la résistance aux pesticides ou encore à la lutte intégrée contre les mauvaises herbes.
- Pour plus d'information ou pour signaler des cas possibles de résistance, s'adresser à Arysta LifeScience North America, LLC, au 1-866-761-9397.

**AVIS À L'UTILISATEUR :** Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

Arysta LifeScience et le logo Arysta LifeScience sont des marques déposées d'Arysta LifeScience Corporation.

SELECT et AMIGO sont des marques déposées d'un Arysta LifeScience Group Company.

BUCTRIL et LIBERTY sont des marques déposées de Bayer.

LONTREL et CURTAIL sont des marques déposées de Dow AgroSciences LLC.

MUSTER est une marque déposée de E.I. DuPont de Nemours and Company.

PURSUIT est une marque déposée de BASF.

©2018 Arysta LifeScience Group Company.









USE WITH AMIGO® ADJUVANT  
UTILISER AVEC L'ADJUVANT AMIGO

GROUP/GROUPE **1** HERBICIDE

**EMULSIFIABLE CONCENTRATE  
POST-EMERGENCE HERBICIDE**

**CONTAINS CLETHODIM**

POST-EMERGENCE HERBICIDE FOR CONTROL OF GRASSES IN SEEDLING ALFALFA, LEGUME VEGETABLES (SUCULENT OR DRIED) AND EDAMAME, HIGHBUSH BLUEBERRY, CANOLA, BASIL, CORIANDER, DILL, CARAWAY, FENUGREEK, CRANBERRY, FLAX (including low linolenic acid varieties), ORIENTAL (BROWN) MUSTARD (condiment and oilseed types), *BRASSICA CARINATA*, YELLOW MUSTARD, DRY BULB ONIONS, DRY BULB SHALLOTS AND GARLIC, POTATOES, PRAIRIE CARNATION, SAFFLOWER, SOYBEANS, SPINACH, and SUNFLOWERS RED GARDEN (TABLE) BEET, PARSNIP, CARROT, RADISH, CHERRY (tart and sweet), CERTAIN HERBS, SPICES and HOPS.

**AGRICULTURAL**

**GUARANTEE: CLETHODIM .....240 g/L**

REGISTRATION NO. 22625  
PEST CONTROL PRODUCTS ACT

**WARNING: EYE AND SKIN IRRITANT  
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN  
READ THE LABEL AND BOOKLET BEFORE USING**

FOR 24-HOUR MEDICAL EMERGENCY ASSISTANCE CALL  
PROPHARMA: 1-866-303-6952 or +1-651-603-3432.

FOR 24-HOUR CHEMICAL EMERGENCY (Spill, leaks, fire, exposure, or accident)  
CALL CHEMTREC: 1-800-424-9300 or +1-703-527-3887.

For Product Use Information Call 1-866-761-9397



**ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA, LLC**  
15401 Weston Parkway, Suite 150  
Cary, NC 27513  
United States

032218V002  
102759-D(0918)

**NET CONTENTS: 3 LITRES**

**CONTENU NET : 3 LITRES**

**CONCENTRÉ ÉMULSIFIABLE  
HERBICIDE DE POSTLEVÉE**

**CONTIENT DE LA CLÉTHODIME**

HERBICIDE DE POSTLEVÉE POUR LA SUPPRESSION DES GRAMINÉES DANS LES SEMIS DE LUZERNE, LES GRAINES VERTES OU SÈCHES DE LÉGUMINEUSES ET EDAMAME, LES BLEUETS EN CORYMBE, LE CANOLA, LE BASILIC, LA CORIANDRE, L'ANETH, LE CARVI COMMUN, LE FENUGREC, LA CANNEBERGE, LE LIN (y compris les variétés à basse teneur en acide linoléique), LA MOUTARDE JONCÉE (types condimentaire et à graine oléagineuse), LE *BRASSICA CARINATA*, LA MOUTARDE JAUNE, LES OIGNONS SEC, L'ÉCHALÔTE, BULBE ET L'AIL, LES POMMES DE TERRE, LES PRAIRIE CARNATION, LE CARTHAME, LE SOJA, L'ÉPINARD, LE TOURNESOL, LA BETTERAVE POTAGÈRE, LE PANAIS, LA CAROTTE, LE RADIS, LA CERISE (DOUCE ET ACIDE), CERTAINES FINES HERBES, ET ÉPICES, ET LE HOUBLON.

**AGRICOLE**

**GARANTIE : CLÉTHODIME .....240 g/L**

N° D'HOMOLOGATION : 22625  
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

**AVERTISSEMENT :  
IRRITANT POUR LES YEUX ET LA PEAU  
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS  
LIRE L'ÉTIQUETTE ET LE LIVRET AVANT L'EMPLOI**

En cas d'urgence médicale, appeler  
PROPHARMA au 1-866-303-6952 ou +1-651-603-3432.

En cas d'urgence chimiques (déversements, fuites, incendie, exposition ou accident) appeler CHEMTREC au 1-800-424-9300 ou +1-703-527-3887.

Renseignements sur le produit : 1-866-761-9397

Arysta LifeScience and the Arysta LifeScience logo are registered trademarks of Arysta LifeScience Corporation.

SELECT and AMIGO are registered trademarks of an Arysta LifeScience Group Company. Arysta LifeScience et le logo Arysta LifeScience sont des marques déposées d'Arysta LifeScience Corporation.

SELECT et AMIGO sont des marques déposées d'un Arysta LifeScience Group Company.