

# TRIMEC 1000

**LOW ODOR BROADLEAF HERBICIDE**

**Controls Dandelion, Spurge, Clover, Plantain, Ground Ivy, Oxalis, and Many Other Broadleaf Weeds as Listed**

**ACTIVE INGREDIENTS:**

2,4-D, diethanolamine salt (DEA) . . . . .	34.59%
2,4-D, dimethylamine salt (DMA) . . . . .	1.22%
MCPP-p, dimethylamine salt (DMA) . . . . .	8.17%
Dicamba, dimethylamine salt (DMA) . . . . .	2.68%
<b>INERT INGREDIENTS:</b> . . . . .	<b>53.34%</b>
<b>TOTAL 100.00%</b>	

**THIS PRODUCT CONTAINS:**

2.37 lb. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid equivalent per gallon or 24.45%.  
 0.65 lb. (+)-(R)-2-(2-methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid equivalent per gallon or 6.67%.  
 0.22 lb. 3,6-dichloro-o-anisic acid equivalent per gallon or 2.23%.

Isomer Specific by AOAC Methods

## KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN WARNING-AVISO

Si Usted no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique a Usted en detalle. (If you do not understand the label, find someone to explain it to you in detail.)



**READ THE ENTIRE LABEL FIRST. OBSERVE ALL PRECAUTIONS AND FOLLOW DIRECTIONS CAREFULLY.**

### PRECAUTIONARY STATEMENTS

**Hazards to Humans and Domestic Animals**

**WARNING:** Causes substantial but temporary eye injury. Do not get in eyes or on clothing. Harmful if swallowed.

**Personal Protective Equipment (PPE)**

Some materials that are chemical-resistant to this product are natural rubber. If you want more options, follow the instructions for category A on an EPA chemical-resistance category selection chart.

All mixers, loaders, applicators and other handlers must wear\*:

- protective eyewear (goggles, face shield, or safety glasses),
- long-sleeved shirt and long pants,
- shoes and socks,
- chemical-resistant gloves (such as natural rubber, selection category A)
- chemical-resistant apron when mixing or loading, cleaning up spills or equipment, or otherwise exposed to the concentrate.

\*Applicators may choose not to wear protective eyewear with dilution rates greater (higher) than 10:1 or greater (higher) than 10 parts of water to 1 part of product.

See engineering controls for additional requirements.

**Engineering Control Statements**

When handlers use closed systems or enclosed cabs in a manner that meets the requirements listed in the Worker Protection Standard (WPS) for agricultural pesticides [40 CFR 170.240 (d)(4-6)], the handler PPE requirements may be reduced or modified as specified in the WPS.

**User Safety Requirements**

Follow manufacturer's instructions for cleaning/maintaining PPE. If no such instructions for washables exist, use detergent and hot water. Keep and wash PPE separately from other laundry. Discard clothing and other absorbent material that have been drenched or heavily contaminated with the product's concentrate. Do not reuse them.

**User Safety Recommendations**

- Users should wash hands thoroughly with soap and water after handling and before eating, drinking, chewing gum, using tobacco, or using the toilet.
- Users should remove clothing/PPE immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing. If pesticide gets on skin, wash immediately with soap and water.
- Users should remove PPE immediately after handling this product. Wash the outside of gloves before removing. As soon as possible, wash thoroughly and change into clean clothing.

**First Aid**

<b>If in eyes:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hold eye open and rinse slowly and gently with water for 15-20 minutes.</li> <li>• Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eye.</li> <li>• Call a poison control center or doctor for treatment advice.</li> </ul>
<b>If swallowed:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice.</li> <li>• Have person sip a glass of water if able to swallow.</li> <li>• Do not induce vomiting unless told to do so by the poison control center or doctor.</li> <li>• Do not give anything by mouth to an unconscious person.</li> </ul>

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor or going for treatment. You may also contact 1-877-800-5556 for emergency medical treatment advice.

**NOTE TO PHYSICIAN:** Probable mucosal damage may contraindicate the use of gastric lavage.

**Environmental Hazards**

This pesticide is toxic to fish and aquatic invertebrates and may adversely affect non-target plants. Do not apply directly to water, to areas where surface water is present, or to intertidal areas below the mean high water mark. Drift and runoff may be hazardous to aquatic organisms in water adjacent to treated areas. Do not contaminate water when disposing of equipment wash waters or rinsate.

This chemical has properties and characteristics associated with chemicals detected in groundwater. The use of this chemical in areas where soils are permeable, particularly where the water table is shallow, may result in groundwater contamination. Application around a cistern or well may result in contamination of drinking water or groundwater.

### DIRECTIONS FOR USE

It is a violation of Federal law to use this product in a manner inconsistent with its labeling.

Do not apply this product in a way that will contact workers or other persons, either directly or through drift. Only protected handlers may be in the area during application. For any requirements specific to your State or Tribe, consult the agency responsible for pesticide regulation.

**Agricultural Use Requirements**

Use this product only in accordance with its labeling and with the Worker Protection Standard, 40 CFR part 170.

This standard contains requirements for the protection of agricultural workers on farms, forests, nurseries, and greenhouses, and handlers of agricultural pesticides. It contains requirements for training, decontamination, notification, and emergency assistance. It also contains specific instructions and exceptions pertaining to the statements on this label about personal protective equipment and restricted-entry interval. The requirements in this box only apply to uses of this product that are covered by the Worker Protection Standard.

Do not enter or allow worker entry into treated areas during the restricted-entry interval (REI) of 48 hours.

(cont. on next page)

**Agricultural Use Requirements (cont.)**

PPE required for early entry to treated areas that is permitted under the Worker Protection Standard and that involves contact with anything that has been treated, such as plants, soil, or water is:

- coveralls worn over short-sleeved shirt and short pants,
- chemical-resistant footwear plus socks,
- chemical-resistant gloves made of any water-proof material,
- chemical-resistant headgear for overhead exposure,
- protective eyewear.

**Non-Agricultural Use Requirements**

The requirements in this box apply to uses of this product that are NOT within the scope of the Worker Protection Standard for agricultural pesticides (40 CFR Part 170). The WPS applies when this product is used to produce agricultural plants on farms, forests, nurseries, or greenhouses.

**Reentry Statement:** Do not enter or allow people (or pets) to enter the treated area until sprays have dried.

**1. Spray Drift Management**

A variety of factors including weather conditions (e.g., wind direction, wind speed, temperature, relative humidity) and method of ground application can influence pesticide drift. The applicator must evaluate all factors and make appropriate adjustments when applying this product.

**Droplet Size**

Use only Medium or coarser spray nozzles according to ASAE (S 572) definition of standard nozzles or a volume mean diameter of 300 microns or greater for spinning atomizer nozzles.

**Wind Speed**

Do not apply at wind speeds greater than 10 mph. Only apply this product if the wind direction favors on-target deposition and there are not sensitive areas (including, but not limited to, bodies of water, known habitat for nontarget species, nontarget crops) within 250 feet downwind.

**Temperature Inversions**

If applying at wind speeds less than 3 mph, the applicator must determine if: a) conditions of temperature inversion exist, or b) stable atmospheric conditions exist at or below nozzle height. Do not make applications into areas of temperature inversions or stable atmospheric conditions.

**Susceptible Plants**

Do not apply under circumstances where spray drift may occur to food, forage, or other plantings that might be damaged or crops thereof rendered unfit for sale, use or consumption. Susceptible crops include, but are not limited to, cotton, okra, flowers, grapes (in growing stage), fruit trees (foliage), soybeans (vegetative stage), ornamentals, sunflowers, tomatoes, beans, and other vegetables, or tobacco. Small amounts of spray drift that might not be visible may injure susceptible broadleaf plants.

**Other State and Local Requirements**

Applicators must follow all state and local pesticide drift requirements regarding application of 2,4-D herbicides. Where states have more stringent regulations, they must be observed.

**Equipment**

All ground application equipment must be properly maintained and calibrated using appropriate carriers or surrogates. Do not apply with a nozzle height greater than 4 feet above the crop canopy.

**2. Product Description**

Designed for turfgrass applications, this product contains four active ingredients.

- (1) 2,4-D in the form of DEA salt, is an auxin-type herbicide, which is a class of plant growth regulators that is low odor and known to control deep rooted perennials. It is absorbed through the leaves and is translocated to the growing points of the plant, causing weed stems curl and twist, leaf cupping and withering, and eventual plant death.
- (2) 2,4-D in the form of DMA salt, is an auxin-type herbicide which is a class of plant growth regulators. It is absorbed through the leaves and is translocated to the growing points of the plant, causing weed stems curl and twist, leaf cupping and withering, and eventual plant death.
- (3) MCPP-p (mecoprop-p) is an auxin-type herbicide, which is a class of plant growth regulators. It is absorbed through the leaves and

is translocated to the growing points of the plant, causing weed stems curl and twist, leaf cupping and withering, and eventual plant death.

- (4) Dicamba is absorbed through the leaves and roots and has multiples modes of actions for hard-to-kill broadleaf weeds.

Combining these herbicides provides a very wide spectrum of weed control for susceptible weeds. Trimec® 1000 Low Odor Broadleaf Herbicide controls weeds by affecting multiple sites within the broadleaf weeds. The symptoms of susceptible broadleaf weeds include leaf and stem curl or twisting, and weed yellowing.

These combined herbicides provide limited residual activity.

**Trimec 1000 Low Odor Broadleaf Herbicide offers these advantages:**

- Excellent postemergent activity with proven performance.
- Low-odor formulation
- The combinations of these active ingredients provide effective weed control for common and troublesome weed species in turfgrass, including: dandelion, spurge and white clover.
- Often, the weed injury symptoms can be noticed within hours of the application and plant death can occur within 14 to 21 days.

**3. Spray Preparation and Tank Mixes**

In certain applications, liquid fertilizer may replace part of the water.

**Mixing with water:**

Add one-half the required amount of water to the spray tank, then add Trimec 1000 Low Odor Broadleaf Herbicide slowly with agitation, and complete filling the tank with water. Mix thoroughly and continue agitation while spraying. When this product is left standing for extended periods of time, re-agitate to assure uniformity of the spray mixture.

**Mixing with liquid fertilizers:**

Use suitable sources and rates of fertilizer based upon advice of your fertilizer supplier or State Extension Service Specialist.

Verify physical compatibility with a jar test: Always perform a jar test for compatibility before large scale mixing. The jar test can be conducted by mixing all components in a small container in proportionate quantities. If the mixture separates after standing and can be mixed readily by shaking, then the mixture can be used and applied with spray equipment providing continuous agitation. If large flakes, sludge, gels or other precipitates form, or if a separate oily layer or oil globules appear, then the herbicide and the liquid fertilizer must not be prepared as a tank mixture.

Liquid fertilizers are either solutions (true fluids) or suspensions. Mixing this product with suspensions or N-P-K solutions may not be satisfactory (may be marginal) without pre-mixing this product with water. Premixing this product with 2 to 4 parts water will ensure that the dispersants enable the herbicide to be suspended in the fertilizer.

**Adjuvants and spray additives:**

Adjuvants (such as surfactants, spreaders, spreader-stickers, spray thickeners, foaming agents, activators, detergents, and drift reducing agents) combined with this product can damage the leaf tissue of turfgrass. If any discoloration or cosmetic effects are objectionable or would be unacceptable, then adjuvant(s) combined with Trimec 1000 Low Odor Broadleaf Herbicide would not be recommended. Do not use adjuvants and spray additive tank-mix combinations, unless your experience indicates that the tank mixture will not result in turf injury. When an adjuvant is used with this product, PBI/Gordon Corporation recommends the use of Chemical Producers and Distributors Association (CPDA) certified adjuvant.

**4. Ground Equipment**

**Spray distribution:** The accuracy and uniformity of the herbicide distribution is the sole responsibility of the applicator. Power sprayers fitted with a boom or spray wand/gun may be used for broadcast applications and spot treatments. Boom sprayers equipped with appropriate nozzles, tips, and screens are suitable for broadcast applications. For best spray distribution and coverage, select a spray volume and delivery system that will ensure accurate and uniform coverage.

Spray volumes of 5 to 220 gallons per acre with spray pressures adjusted to between 20 to 40 psi. Note: For bentgrass (except golf greens) spray volumes, use 145 to 220 gallons per acre. Use higher spray volumes for dense weed populations (up to 220 gallons per acre or 5 gallons per 1,000 square feet).

- Calibration and proper application are essential when using this product.
- Over-application or rates above those specified on this label can cause turf injury.

- Hand-held technique: Wands fitted with flat fan nozzle tips may be used with the appropriate technique. Flat fan nozzles should not be waved in a back-and-forth motion, or in a side-to-side motion, or in a swinging arm motion. Instead, the nozzle should be held stationary at the proper height. Side-to-side motion results in uneven coverage.

Hand operated sprayers including backpack sprayers, compression sprayers are appropriate for small turfgrass areas.

After using this product, clean sprayer with soap or detergent and water, or an approved spray tank cleaner and rinse thoroughly before applying other pesticides.

## 5. Where to Use

This product provides broadleaf control in the following sites.

### • Ornamental Turfgrass sites:

- **Residential/domestic sites** are defined as areas associated with the household or home life including, but not limited to apartment complexes, condominiums, and patient care areas of nursing homes, mental institutions, hospitals, or convalescent homes.
- **Ornamental turf sites** include turfgrass established around residences, parks, streets, retail outlets, cemeteries, industrial and institutional buildings, recreation areas, fairgrounds, areas adjacent to athletic fields and paved areas.
- **Institutional sites** are defined as turf areas around properties or facilities providing a service to public or private organizations including, but not limited to hospitals, nursing homes, schools, museums, libraries, sport facilities, golf courses (fairways and roughs), and office buildings.
- **Non-cropland sites:** including farmyards, fencerows or fence lines, highway rights-of-way (principal, interstate, county, private, and unpaved roads): Roadsides, roadside ditches, road shoulders, road embankments, dividers, and medians; Industrial sites: Lumberyards, tank farms, fuel or equipment storage areas; Municipal, state, and federal lands: Airports and military installations; railroad rights-of-ways, railroad yards, railroad crossings and railroad bridge abutments; Utility rights-of-way: telephone, pipeline, electrical powerlines, and communication transmission lines.
- **Agricultural site:** Commercial sod production

### Prohibitions of Sites:

- Do not apply to any body of water such as lakes, streams, rivers, ponds, reservoirs, or estuaries (salt water bays). Do not apply to any shorelines (non-cropland sites adjacent to the edges of a body of water) for lakes, streams, rivers, ponds, reservoirs, or estuaries (salt water bays).
- Do not apply to wetlands (swamps, bogs, potholes, or marshes).
- Do not apply to agricultural irrigation water or on agricultural irrigation ditchbanks and canals.
- Do not apply to agricultural drainage water or on agricultural ditchbanks.
- Do not apply to sites being used for commercial timber or seed production, or to other plants being grown for sale or other commercial use.
- Do not apply or allow this product to come into direct contact with cotton, grapes, tobacco, vegetable crops, flowers, fruit or ornamental trees, or other desirable broadleaf plants; small amounts of spray drift may injure susceptible plants, including ornamental trees or shrubs.

### Turfgrass tolerance:

- The turfgrass tolerance to this product may vary and temporary turfgrass yellowing may occur. Adverse environmental conditions may reduce the selectivity on the turfgrass. Do not apply this product to stressed turf.
- Certain spray tank additives (adjuvants, wetting agents, surfactants), liquid fertilizers, and tank mixtures containing emulsifiable concentrates may reduce the selectivity on the turfgrass. Do not use adjuvants and spray additive tank-mix combinations, unless your experience indicates that the tank mixture will not result in turf injury. When an adjuvant is used with this product, PBI/Gordon Corporation recommends the use of Chemical Producers and Distributors Association (CPDA) certified adjuvant.

### Prohibitions:

- Do not apply this product to St. Augustinegrass, bentgrass greens, carpetgrass, dichondra, legumes, and lawns where desirable clovers are present.
- Do not broadcast apply this product when temperatures are above 90°F, some injury may be expected with spot treatments

when air temperatures exceed 90°F. Where state, county or local governments have more stringent temperature regulations, these regulations must be observed.

- To avoid turf injury, use only on turfgrass that is reasonably free of stress from diseases, insects, excess heat or cold, drought or excess rainfall/irrigation, shaded areas, nematodes, improper mowing or improper applications of fertilizer and pesticides. Injury can occur if this product is applied under any of these or other stress conditions. Under any of these stress conditions, any turf damage caused by the use of this product is beyond the control of the registrant and all risk is assumed by the buyer and/or user.
- For ground application only; aerial applications are not permitted.
- Do not use this product on or near desirable plants, including contact of spray on exposed root systems or adventitious shoots within the dripline of desirable trees and shrubs, since injury may result.

### STATE RESTRICTIONS:

- **California, Oregon, Washington:** Use of this product in certain portions of California, Oregon, and Washington is subject to the January 22, 2004 Order for injunctive relief in Washington Toxics Coalition, et.al. v. EPA, C01-0132C, (W.D. WA). For further information, please refer to EPA web site: <http://www.epa.gov/espp/litstatus/wtc/qs-as.htm>.

## 6. Application Schedules

Apply this product to broadleaf weeds that are young and actively growing for the best results. Fall applications can provide improved control for emerged winter annuals and perennials such as henbit, chickweed, clover and ground ivy.

### For the Listed Residential/domestic sites, Ornamental Turf sites, Institutional sites and Agricultural sites:

Do not apply more than two (2) broadcast treatments of this product per site per year. A second broadcast application or a follow-up application as a spot treatment is advised for more mature weeds, for dense infestations, and for adverse environmental conditions.

Spot treatments during the summer may be appropriate for sparse infestations, or as a follow-up treatment, or any time broadleaf weeds are actively growing.

### For the Listed Non-cropland sites:

Use only two broadcast treatments for annual and perennial weeds. It is required to wait 30 days between treatments and a spot treatment may be substituted for the second broadcast treatment if necessary.

Extremes in environmental conditions e.g. temperature and moisture, soil conditions, and cultural practices may affect the activity of this product. Under warm moist conditions, herbicide symptoms may be accelerated. While under very dry conditions, the expression of herbicide symptoms is delayed, and weeds hardened off by drought are less susceptible to this product.

### For newly seeded areas:

Delay application of this product to grass seedlings until after the second mowing.

### For newly sodded, sprigged, or plugged areas:

The application of this product to newly sodded, sprigged, or plugged grasses should be delayed until 3 to 4 weeks after the sodding, sprigging, or plugging operations.

### Reseeding interval:

Treated areas may be reseeded 3 weeks after application.

## 7. How Much to Use

### USE RATES AND SPRAY VOLUMES:

Generally, the lower application rates within the specified range will provide satisfactory control of sensitive weed species. The higher application rates within the specified range will be required for dense infestations of perennial weeds, for adverse/extreme environmental conditions, or for weeds hardened off or more mature.

TABLE 1. Use rates for ornamental turf sites, non-cropland, and sod farms.		
Species	Rate	Spray Volume
<b>COOL-SEASON TURF</b>		
<b>Kentucky bluegrass, annual bluegrass, annual ryegrass, perennial ryegrass, tall fescue, red or fine leaf fescues</b>	3.0 to 4 Pints/Acre (1.1 to 1.5 fl. oz./1,000 sq. ft.)	5 to 220 Gallons/Acre (0.125 to 5.0 Gallons/1,000 sq. ft.)
<b>Creeping Bentgrass</b> (excluding golf greens) Apply preferably in May or mid-August through September. Slight turf yellowing will disappear after about one (1) week. Note: Care should be taken to avoid overdosing bentgrass or injury may result.	1.8 Pints/Acre (0.66 fl. oz./1,000 sq. ft.)	145 to 220 Gallons/Acre (3.33 to 5.0 Gallons/1,000 sq. ft.)  High spray volumes will provide uniform coverage.
<b>WARM-SEASON TURF</b>		
<b>Hybrid bermudagrass, common bermudagrass, zoysiagrass, buffalograss and bahiagrass.</b> Slight turf yellowing will disappear after about one (1) week.	3.0 to 4 Pints/Acre (1.1 to 1.5 fl. oz./1,000 sq. ft.)  Sod Farms: 2 to 2.25 Pints/Acre (0.75 to 0.83 fl. oz./1,000 sq. ft.)	5 to 220 Gallons/Acre (0.125 to 5.0 Gallons/1,000 sq. ft.)
<p><b>Note:</b> Do not apply to above listed warm-season turfgrass unless some turf injury can be tolerated. It is impossible to test all environmental conditions for the listed warm-season turfgrass.</p> <p>Do not apply this product to warm-season turfgrass during spring green-up or in the fall during the transition period between active growth and dormancy.</p> <p><b>Dormant turf:</b> This product may be applied to fully dormant bermudagrass, fully dormant Zoysiagrass, fully dormant buffalograss and fully dormant bahiagrass.</p>		

### SPOT TREATMENT:

#### WITH HAND OPERATED SPRAYERS (INCLUDING BACKPACK SPRAYERS AND PUMP-UP TYPE SPRAYERS):

- Apply any time the emerged broadleaf weeds are actively growing.
- Calibration and proper application are essential when using this product.
- Uniform applications are essential when using this product. Over application or rates above those specified on this label including excessive overlaps of this product can cause turf injury.
- Hand-held techniques: Wands fitted with flat fan nozzle tips may be used with the appropriate technique. Flat fan nozzles should not be waved in a back-and-forth motion, or in a side-to-side motion, or in a swinging arm motion. Instead, the nozzle should be held stationary at the proper height. Side-to-side motion results in uneven coverage.
- Follow-up applications as spot treatments at a 30 day interval are suitable for more mature weeds, for dense infestations, and for adverse environmental conditions.
- **Limitations on spot treatments to residential turfgrass:** Spot treatment is defined as a treatment area no greater than 1,000 sq.ft. per acre. The maximum application rate is 1.5 fl. oz. per 1,000 sq. ft. per application. The maximum number of spot treatments is limited to 2 per year with a minimum of 30 days between applications.
- **For cool-season turfgrass (except Bentgrass) listed in Table 1:** Mix 1.1 to 1.5 fl. oz. of this product per one (1.0) gallon of water for treatment of approximately 1,000 sq. ft. of turfgrass. Apply any time the emerged broadleaf weeds are susceptible.
- **For Bentgrass (excluding golf greens):** Mix 0.66 fl. oz. of this product per four (4.0) gallons of water for treatment of approximately 1,000 sq. ft. of turfgrass. This high spray volume will provide uniform coverage. Apply any time the emerged broadleaf weeds are susceptible.
- **For warm-season turfgrass listed in Table 1:** Mix 0.75 to 0.83 fl. oz. of this product per one (1.0) gallon of water for treatment of approximately 1,000 sq. ft. of turfgrass. Apply any time the emerged broadleaf weeds are susceptible.

### CULTURAL TIPS:

#### Irrigation:

- Do not apply this product through any type of irrigation system.
- Rainfast in as little as 8 hours. Do not apply this product immediately before rainfall or irrigation.
- If possible, do not irrigate or water the turfgrass within 8 to 24 hours after application.
- If dry conditions exist, a scheduled irrigation or watering 24 hours before and 24 hours after application is recommended.

#### Mowing:

For optimum results, delay mowing 2 days before and until 2 days after the application of this product.

Use Site	Maximum Rate per Application	Maximum Number of Applications per Year	Minimum Interval Between Applications	Maximum Seasonal Rate
Ornamental turfgrass sites	4.0 pints/A (1.19 lb. 2,4-D ae/A) (0.33 lb. MCP-P ae/A) (0.11 lb. dicamba ae/A)	2	30 Days	8.0 pints/A (2.37 lb. 2,4-D ae/A) (0.65 lb. MCP-P ae/A) (0.22 lb. dicamba ae/A)
Sod farms	4.0 pints/A (1.19 lb. 2,4-D ae/A) (0.33 lb. MCP-P ae/A) (0.11 lb. dicamba ae/A)	2	30 Days	8.0 pints/A (2.37 lb. 2,4-D ae/A) (0.65 lb. MCP-P ae/A) (0.22 lb. dicamba ae/A)
Non-cropland	4.0 pints/A (1.19 lb. 2,4-D ae/A) (0.33 lb. MCP-P ae/A) (0.11 lb. dicamba ae/A)	2 (annual and perennial weeds)	30 Days	8.0 pints/A (2.37 lb. 2,4-D ae/A) (0.65 lb. MCP-P ae/A) (0.22 lb. dicamba ae/A)

### 8. Broadleaf Weeds Controlled

Trimec 1000 Low Odor Broadleaf Herbicide will control the following broadleaf weeds. Apply any time the emerged broadleaf weeds are susceptible.

#### BROADLEAF WEEDS

- |                                    |   |  |  |
|------------------------------------|---|--|--|
| annual fleabane                    | dogfennel                                       | lespedeza, common  | shepherdspurge   |
| aster, white heath & white prairie | dovefoot geranium                               | mallow, common   | spotted spurge   |
| bedstraw                           | false dandelion (*spotted)                      | matchweed  | spurge   |
| beggarticks                        | catsear & common catsear                        | mouseear chickweed                                       | sunflower  |
| beggarweed, creeping               | field bindweed (*morningglory & creeping jenny) | mustard  | thistle  |
| bindweed                           | field madder                                    | nettle   | velvetleaf (*buttonweed)   |
| birdsfoot trefoil                  | field oxeye-daisy                               | old world diamond flower                                 | Venice mallow  |
| black medic                        | (*creeping oxeye)                               | <i>Oxalis</i> (*yellow woodsorrel & creeping woodsorrel) | <i>Veronica</i> (*corn speedwell)  |
| broadleaf plantain                 | field pennycress                                | parsley-piert  | Virginia buttonweed**  |
| buckhorn plantain                  | filaree, whitestem & redstem                    | Pennsylvania smartweed                                   | Virginia-creeper   |
| bull thistle                       | Florida pusley                                  | pennywort (*dollarweed)                                  | western salsify  |
| burclover                          | ground ivy                                      | pepperweed   | white clover (*Dutch clover, honeysuckle clover, white trefoil & purplewort) |
| burdock, common                    | groundsel                                       | pigweed  | wild carrot  |
| Carolina geranium                  | hairy bittercress                               | pineappleweed  | wild garlic  |
| carpetweed                         | hawkweed  | plantain   | wild geranium  |
| chickweed, common                  | healall   | poison ivy   | wild lettuce   |
| chicory                            | henbit  | poison oak   | wild mustard   |
| cinquefoil                         | horsenettle                                     | prostrate knotweed (*knotweed)                           | wild onion   |
| clover                             | horseweed                                       | puncturevine   | wild strawberry  |
| cocklebur                          | innocence (Blue-eyed Mary)                      | purple cudweed   | yarrow   |
| compassplant                       | jimsonweed                                      | purslane   | yellow rocket  |
| curly dock                         | kochia  | ragweed  |  |
| dandelion                          | knotweed  | redweed  |  |
| dayflower                          | lambsquarters                                   | red sorrel (*sheep sorrel)                               |  |
| deadnettle                         | lawn burweed                                    | roundleaf greenbriar                                     |  |
| dock                               |   |  |  |

\*Synonyms

\*\*A repeat application may be required in 30 days

**STORAGE AND DISPOSAL**

Do not contaminate water, food, or feed by storage and disposal.

**PESTICIDE STORAGE:** Store in original container in a locked storage area inaccessible to children or pets. Keep from freezing.

**PESTICIDE DISPOSAL:** Pesticide wastes are acutely hazardous. Improper disposal of excess pesticide, spray mixture, or rinsate is a violation of Federal law. If these wastes cannot be disposed of by use according to label instructions, contact your State Pesticide or Environmental Control Agency, or the Hazardous Waste Representative at the nearest EPA Regional Office for guidance.

**For nonrefillable containers less than or equal to 5 gallons:**

**CONTAINER HANDLING:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling, if available, or puncture and dispose of in a sanitary landfill, or by incineration, or, if allowed by state and local authorities, by burning. If burned, stay out of smoke.

Triple rinse or pressure rinse container (or equivalent) promptly after emptying.

Triple rinse as follows: Empty the remaining contents into application equipment or a mix tank and drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Fill the container 1/4 full with water and recap. Shake for 10 seconds. Pour rinsate into application equipment or a mix tank or store rinsate for later use or disposal. Drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Repeat this procedure two more times.

OR

Pressure rinse as follows: Empty the remaining contents into application equipment or a mix tank and continue to drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Hold container upside down over application equipment or mix tank or collect rinsate for later use or disposal. Insert pressure rinsing nozzle in the side of the container, and rinse at about 40 PSI for at least 30 seconds. Drain for 10 seconds after the flow begins to drip.

**For nonrefillable containers greater than 5 gallons:**

**CONTAINER HANDLING:** Nonrefillable container. Do not reuse or refill this container. Offer for recycling, if available, or puncture and dispose of in a sanitary landfill, or by incineration, or, if allowed by state and local authorities, by burning. If burned, stay out of smoke.

Triple rinse or pressure rinse container (or equivalent) promptly after emptying.

Triple rinse as follows: Empty the remaining contents into application equipment or a mix tank. Fill the container 1/4 full with water. Replace and tighten closures. Tip container on its side and roll it back and forth, ensuring at least one complete revolution, for 30 seconds. Stand the container on its end and tip it back and forth several times. Turn the container over onto its other end and tip it back and forth several times. Empty the rinsate into application equipment or a mix tank or store rinsate for later use or disposal. Repeat this procedure two more times.

OR

Pressure rinse as follows: Empty the remaining contents into application equipment or a mix tank and continue to drain for 10 seconds after the flow begins to drip. Hold container upside down over application equipment or mix tank or collect rinsate for later use or disposal. Insert pressure rinsing nozzle in the side of the container, and rinse at about 40 PSI for at least 30 seconds. Drain for 10 seconds after the flow begins to drip.

**For refillable containers:**

**CONTAINER HANDLING:** Refillable container. Refill this container with pesticide only. Do not reuse this container for any other purpose.

Container cleaning: Cleaning the container before final disposal is the responsibility of the person disposing of the container. Cleaning before refilling is the responsibility of the refiller.

To clean the container before final disposal, empty the remaining contents from this container into application equipment or a mix tank. Fill the container about 10 percent full with water. Agitate vigorously or recirculate water with the pump for 2 minutes. Pour or pump rinsate into application equipment or rinsate collection system. Repeat this rinsing procedure two more times.

**LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER**

**IMPORTANT:** Read this LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER before buying or using this product. By opening and using this product, buyer and all users agree to accept the terms of this LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER in their entirety and without exception. If the terms are not acceptable, return this product unopened immediately to the point of purchase, and the purchase price will be refunded in full.

It is impossible to eliminate all risks inherently associated with use of this product. Damage to the treated article, ineffectiveness, or other unintended consequences can result from use of the product under abnormal conditions such as weather, presence of other materials, or the manner of use or application, etc. Such factors and conditions are beyond the control of the manufacturer, and **BY PURCHASING AND USING THIS PRODUCT THE BUYER AND ALL USERS OF THIS PRODUCT AGREE TO ACCEPT ALL SUCH RISKS.** Buyer and all users further agree to assume all risks of loss or damage from the use of the product in any manner that is not explicitly set forth in or that is inconsistent with label instructions, warnings and cautions.

The manufacturer warrants only that this product conforms to the chemical description given on the label, and that the product is reasonably suited for the labeled use when applied according to the Directions for Use, subject to the inherent risks described below. **TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, THE MANUFACTURER NEITHER MAKES NOR INTENDS ANY OTHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMED.**

**TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, THE EXCLUSIVE REMEDY OF BUYER AND ALL USERS OF THIS PRODUCT, AND THE EXCLUSIVE LIABILITY OF THE MANUFACTURER, FOR ANY AND ALL LOSSES, DAMAGES, OR INJURIES RESULTING FROM THE USE OR HANDLING OF THIS PRODUCT, WHETHER OR NOT BASED IN CONTRACT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY IN TORT OR OTHERWISE, SHALL BE LIMITED, AT THE MANUFACTURER'S OPTION, TO REPLACEMENT OF OR THE REPAYMENT OF THE PURCHASE PRICE FOR THE QUANTITY OF PRODUCT WITH RESPECT TO WHICH DAMAGES ARE CLAIMED. TO THE EXTENT CONSISTENT WITH APPLICABLE LAW, IN NO CASE SHALL THE MANUFACTURER BE LIABLE FOR INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR SPECIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OR HANDLING OF THIS PRODUCT.** The Manufacturer must be promptly notified in writing of any claims, whether based in contract, tort, negligence, strict liability, or otherwise, to be eligible to receive either remedy stated above.

The terms of this LIMITED WARRANTY AND DISCLAIMER cannot be varied by any written or verbal statements or agreements at the point of sale or elsewhere. No employee or agent of the manufacturer or seller is authorized to vary or exceed the terms of this Limited Warranty and Disclaimer in any manner.

ATTENTION: This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer.

994/11-2023 AP052113  
EPA REG. NO. 2217-931



Employee-Owned

**MANUFACTURED BY**  
**PBI/GORDON CORPORATION**  
P.O. BOX 860350  
SHAWNEE, KANSAS 66286  
PBIgordonTurf.com

ATTENTION: This specimen label is provided for informational use only. This product may not yet be available for sale in your state or area. The information found in this label may differ from the information found on the product label you are using. Always follow the instructions for use and precautions on the label of the product you are using.

# TRIMEC 1000

## LOW ODOR BROADLEAF HERBICIDE

**Controla el diente de león, las euforbiáceas, el trébol, el llantés, la hiedra terrestre, el oxalis y muchas otras malezas de hoja ancha enumeradas**

**ACTIVE INGREDIENTS:**

2,4-D, diethanolamine salt (DEA) . . . . .	34.59 %
2,4-D, dimethylamine salt (DMA) . . . . .	1.22 %
MCPP-p, dimethylamine salt (DMA) . . . . .	8.17 %
Dicamba, dimethylamine salt (DMA) . . . . .	2.68 %
<b>INERT INGREDIENTS:</b> . . . . .	<b>53.34 %</b>

TOTAL 100.00 %

**THIS PRODUCT CONTAINS:**

2.37 lb. 2,4-dichlorophenoxyacetic acid equivalent per gallon or 24.45%.  
 0.65 lb. (+)-(R)-2-(2-methyl-4-chlorophenoxy)propionic acid equivalent per gallon or 6.67%.  
 0.22 lb. 3,6-dichloro-o-anisic acid equivalent per gallon or 2.23%.

Isomer Specific by AOAC Methods

### MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

## AVISO

Si no entiende la etiqueta, busque a alguien para que se la explique en detalle. (If you do not understand the label, find someone to explain it to you in detail.)



**LEA PRIMERO LA ETIQUETA COMPLETA. OBSERVE TODAS LAS PRECAUCIONES Y SIGA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE.**

### DECLARACIONES PREVENTIVAS

**Riesgos para los seres humanos y animales domésticos**

**AVISO:** Causa lesiones oculares severas aunque temporales. No permita que caiga en los ojos ni la ropa. Dañino si se ingiere.

**Equipo de protección personal (PPE, por sus siglas en inglés)**

Un material que es resistente a las sustancias químicas de este producto es el caucho natural. Si desea conocer más opciones, consulte las instrucciones para la categoría A en la tabla de categorías de resistencia química de la EPA.

Todas las personas que mezclen, carguen, apliquen y manipulen el producto deben usar\*:

- protección ocular (gafas de seguridad, máscara protectora o lentes protectores),
- camisa de manga larga y pantalones largos,
- zapatos y calcetines,
- guantes resistentes a sustancias químicas (como los de caucho natural, categoría de clasificación A),
- delantal o mandil resistente a productos químicos cuando se mezcle o cargue el concentrado, se limpien derrames o se lave el equipo, o al exponerse de cualquier otro modo al herbicida.

\*Quienes apliquen el producto pueden optar por no usar protección ocular cuando el índice de dilución sea mayor que 10:1, es decir, superior a 10 partes de agua por 1 parte de producto.

Para más información sobre los requisitos, consulte los controles de ingeniería.

**Declaraciones de control técnico**

Cuando los manipuladores de este producto utilizan sistemas cerrados o cabinas cerradas de conformidad con los requisitos estipulados en el Estándar para la Protección del Trabajador (WPS, según siglas en inglés) relativos a los pesticidas agrícolas [40 CFR 170.240 (d)(4-6)], es posible reducir o modificar los requisitos relativos al equipo protector personal del manipulador, según lo especificado en el WPS.

**Requisitos de seguridad para los usuarios**

Siga las instrucciones del fabricante para la limpieza/el mantenimiento del equipo de protección personal (PPE). En caso de no existir dichas instrucciones de lavado, utilice detergente y agua caliente. Mantenga y lave el PPE separadamente de otra ropa para lavar. Deseche la ropa y otros materiales absorbentes que hayan sido empapados o muy contaminados con el concentrado del producto. No la reutilice.

**Recomendaciones de seguridad para el usuario**

- Los usuarios deben lavarse las manos con abundante agua y jabón luego de manipular el producto y antes de comer, beber, masticar chicle, consumir tabaco o ir al baño.
- Los usuarios deben quitarse la ropa y los equipos de protección inmediatamente si les entra pesticida. Después debe lavarse cuidadosamente y ponerse ropa limpia. Si el pesticida entra en contacto con la piel, lave la zona afectada de inmediato con abundante agua y jabón.
- Los usuarios deben quitarse el equipo de protección personal inmediatamente después de manipular este producto. Lave el exterior de los guantes antes de quitárselos. Apenas termine, lávese bien y póngase ropa limpia.

**Primeros auxilios**

<b>Si entra en contacto con los ojos:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mantenga los ojos abiertos y enjuáguelos lenta y cuidadosamente con agua, durante 15 a 20 minutos.</li> <li>• Si utiliza lentes de contacto, retírelos después de los primeros 5 minutos y luego continúe enjuagando los ojos.</li> <li>• Llame al centro de control de envenenamientos o a un médico para que le aconsejen un tratamiento.</li> </ul>
<b>Si se ingiere:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Llame de inmediato a un centro de control de envenenamientos o a un médico para que le aconsejen un tratamiento.</li> <li>• Si la persona puede tragar, haga que beba un vaso de agua lentamente.</li> <li>• No induzca el vómito a menos que así se lo indique un centro de control de envenenamientos o un médico.</li> <li>• No administre nada por boca a una persona que haya perdido el conocimiento.</li> </ul>

Cuando llame a un centro de control de envenenamiento o a un médico, o intente obtener tratamiento, tenga a la mano el envase o la etiqueta del producto. También puede comunicarse al 1-877-800-5556 para obtener asesoramiento sobre tratamiento médico de emergencia.

**NOTA PARA EL MÉDICO:** Es probable que existan lesiones de la mucosa que contraindiquen el uso del lavado gástrico.

**Riesgos ambientales**

Este pesticida es tóxico para peces e invertebrados acuáticos y puede afectar de forma adversa especies de plantas que no son el objetivo. No aplique el producto directamente al agua, a zonas donde haya presencia de agua superficial ni a las zonas intermareales por debajo de la marca de pleamar media. La deriva y el escurrimiento pueden ser peligrosos para organismos acuáticos residentes en aguas contiguas a las superficies tratadas. No contamine el agua al desechar el agua de lavado o enjuague del equipo.

Este producto químico tiene propiedades y características relacionadas con productos químicos detectados en aguas subterráneas. El uso de este producto químico en superficies con suelos permeables, en particular en donde la capa freática está a poca profundidad, puede contaminar las aguas subterráneas. La aplicación alrededor de una cisterna o un pozo puede causar la contaminación de agua potable o subterránea.

### MODO DE EMPLEO

El uso de este producto de forma contraria a lo indicado en su etiqueta constituye infracción de la ley federal.

No aplique este producto de tal manera que vaya a quedar en contacto con los trabajadores u otras personas, sea directamente o por deriva. Solamente el personal con equipo protector puede estar en la zona durante la aplicación del producto. Para cualquier requisito específico de su estado o tribu, consulte con la agencia responsable de los reglamentos relativos a pesticidas.

**Requisitos para el uso agrícola**

Use este producto solamente de acuerdo con su etiquetado y con el Estándar para la Protección del Trabajador, 40 CFR Parte 170.

Este estándar contiene los requisitos para la protección de los trabajadores agrícolas en granjas, bosques, viveros de plantas e invernaderos, y de los manipuladores de pesticidas agrícolas. Contiene los requisitos para la capacitación, descontaminación, notificación y ayuda en caso de emergencia. Además, contiene las instrucciones específicas y las excepciones correspondientes a las declaraciones en esta etiqueta acerca del equipo protector personal e intervalo de entrada restringida. Los requisitos de esta caja aplican solamente a los usos de este producto cubiertos por el Estándar para la Protección del Trabajador.

No entre ni permita la entrada de trabajadores a las zonas tratadas durante el intervalo de entrada restringida (REI, por sus siglas en inglés) de 48 horas.

(cont. en la página siguiente)

**Requisitos para el uso agrícola (cont.)**

Se requiere equipo protector personal para la entrada prematura a las zonas tratadas según lo permitido por el Estándar para la Protección del Trabajador que comprende el contacto con cualquier cosa que haya sido tratada con el producto, tal como plantas, suelo o agua; se deberá usar:

- overol (mameluco) encima de una camisa de manga corta y pantalones cortos,
- calcetines y zapatos resistentes a productos químicos,
- guantes resistentes a productos químicos hechos de material resistente al agua,
- equipo de protección para la cabeza resistente a productos químicos, para la exposición por encima de la cabeza,
- protección ocular.

**Requisitos para el uso no agrícola**

Los requisitos de esta caja aplican a los usos de este producto que NO figuran dentro del ámbito del Estándar para la Protección del Trabajador para los pesticidas agrícolas (40 CFR Parte 170). El Estándar de Protección del Trabajador rige cuando este producto se usa para tratar plantas agrícolas en granjas, bosques, viveros o invernaderos.

**Declaración de reentrada:** No ingrese ni permita que personas (o mascotas) ingresen a la zona tratada hasta que el producto rociado se haya secado.

**1. Gestión de la deriva de la pulverización**

Una variedad de factores, incluso las condiciones climáticas (por ej. sentido y velocidad del viento, temperatura, humedad relativa) y el método de aplicación en el suelo, afectan la deriva del pesticida. La persona encargada de la aplicación deberá evaluar todos los factores y efectuar los ajustes que correspondan al aplicar este producto.

**Tamaño de gotas**

Use boquillas de pulverización medianas o más gruesas de acuerdo con la definición de ASAE (norma 572) de boquillas estándar o de un diámetro de volumen medio de 300 micrones o mayor para boquillas atomizadoras giratorias.

**Velocidad del viento**

No aplique el producto si la velocidad del viento es mayor que 10 millas/h. Aplique este producto únicamente si el sentido del viento favorece que se deposite sobre el objetivo y no hay zonas sensibles (incluso, pero sin limitarse a cuerpos de agua, hábitats conocidos de especies que no se desea afectar, cultivos que no son el objetivo) a menos de 250 pies de distancia viento abajo.

**Inversiones de temperatura**

Si se aplica con vientos de menos de 3 millas/h, la persona encargada de la aplicación deberá determinar si: a) existen condiciones de inversión de temperatura, o b) existen condiciones atmosféricas estables a la altura de las boquillas o debajo de ésta. No aplique el producto en zonas de inversión de temperatura o condiciones atmosféricas estables.

**Plantas susceptibles**

No aplique en circunstancias en que se podría producir la deriva sobre alimentos, forrajes u otras plantaciones que podrían resultar dañados, o bien que los cultivos de los mismos pasen a ser no aptos para la venta, uso o consumo. Los cultivos susceptibles incluyen, pero no se limitan al algodón, quimbombó, flores, uvas (en etapa de crecimiento), árboles frutales (follaje), soja (estado vegetativo), plantas ornamentales, girasoles, tomates, frijoles y otros vegetales, o tabaco. Las cantidades pequeñas de deriva que podrían no ser visibles pueden lesionar plantas de hoja ancha susceptibles.

**Otros requisitos estatales y locales**

La persona encargada de la aplicación deberá respetar todos los requisitos de deriva de pesticidas estatales y locales referentes a la aplicación de herbicidas 2,4-D. En los estados que tengan reglamentos más estrictos, es obligatorio respetarlos.

**Equipo**

Todo el equipo para aplicaciones terrestres debe ser mantenido y calibrado adecuadamente mediante portadoras o unidades sustitutas apropiadas. No lo aplique con una altura de boquillas superior a los 4 pies por encima del dosel vegetal.

**2. Descripción del producto**

Este producto diseñado para aplicaciones en céspedes contiene cuatro ingredientes activos.

- (1) el 2,4-D es un herbicida tipo auxina en forma de sal dimetilamina que es un regulador del crecimiento de las plantas. De poco olor, es conocido por controlar las plantas perennes de raíces profundas. Se absorbe a través de las hojas y se traslada a los puntos de crecimiento de la planta, lo que provoca que los tallos de las malezas se doblen y retuerzan, las hojas se ahuequen y se marchiten y, finalmente, la planta muera.
- (2) el 2,4-D es un herbicida tipo auxina en forma de sal de monometilamina, que es un regulador del crecimiento de las plantas. Se absorbe a través de las hojas y se traslada a los puntos de crecimiento de la planta, lo que provoca que los tallos de las malezas se doblen y retuerzan, las hojas se ahuequen y se marchiten y, finalmente, la planta muera.
- (3) el MCPP-p (mecocrop-p) es un herbicida tipo auxina, que es un regulador del crecimiento de plantas. Se absorbe a través de las hojas y se traslada a los puntos de crecimiento de la planta, lo que provoca que los tallos de las malezas se doblen y retuerzan, las hojas se ahuequen y se marchiten y, finalmente, la planta muera.

- (4) el Dicamba se absorbe a través de las hojas y las raíces y actúa de múltiples maneras sobre las malezas de hoja ancha difíciles de eliminar.

La combinación de estos herbicidas proporciona un espectro muy amplio de control de las malezas susceptibles. El Herbicida de bajo olor Trimec® 1000 contra malezas de hoja ancha controla las malezas mediante su efecto en múltiples zonas dentro de las malezas de hoja ancha. Los síntomas de las malezas de hoja ancha susceptibles incluyen el enrulamiento o retorcimiento de hojas y tallos y el amarillamiento de la maleza.

Estos herbicidas combinados proporcionan una actividad residual limitada.

**El Herbicida de bajo olor Trimec 1000 contra malezas de hoja ancha ofrece las siguientes ventajas:**

- Excelente actividad posemergente con rendimiento comprobado.
- Fórmula de bajo olor
- Las combinaciones de estos ingredientes activos proporcionan un control eficaz de las malas hierbas más comunes y problemáticas del césped, como el dandelion (*Taraxacum officinale*), spurge (*Euphorbia*) y white clover (*Trifolium repens*).
- En general, los síntomas de daño en la maleza pueden notarse a las pocas horas de la aplicación y la muerte de la planta puede producirse en un plazo de 14 a 21 días.

**3. Preparación del pulverizado y mezclas de tanque**

En ciertas aplicaciones, el fertilizante líquido puede sustituir parte del agua.

**Mezcla con agua:**

Añada la mitad de la cantidad requerida de agua al tanque del pulverizador, después añada el Herbicida de bajo olor Trimec 1000 contra malezas de hoja ancha lentamente, agitándolo, y termine de llenar el tanque con agua. Mezcle completamente y continúe agitando durante la pulverización. Cuando este producto se deja reposar durante periodos prolongados, vuelva a agitar para asegurar la uniformidad de la mezcla de pulverización.

**Mezcla con fertilizantes líquidos:**

Use fuentes adecuadas y dosis de fertilizante basadas en las recomendaciones de su proveedor de fertilizantes o del especialista del Servicio de Extensión Estatal.

Verifique la compatibilidad física con una prueba de jarras: Haga siempre una prueba de compatibilidad en jarra antes de mezclar en gran escala. La prueba de jarras puede realizarse mezclando todos los componentes en cantidades proporcionadas en un recipiente pequeño. Si la mezcla se separa después de reposar y puede mezclarse fácilmente agitándola, puede utilizarse y aplicarse con un pulverizador, agitándolo continuamente. Si se forman gránulos grandes, lodos, geles u otros precipitados, o si aparece una capa aceitosa separada o glóbulos de aceite, el herbicida y el abono líquido no deben prepararse como mezcla de tanque.

Los abonos líquidos son soluciones (verdaderos fluidos) o suspensiones. La mezcla de este producto con suspensiones o soluciones N-P-K puede no ser satisfactoria (puede ser marginal) si no se mezcla previamente este producto con agua. La premezcla de este producto con 2 a 4 partes de agua garantizará que los dispersantes permitan la suspensión del herbicida en el fertilizante.

**Adyuvantes y aditivos de pulverización:**

Los adyuvantes (como tensioactivos, esparcidores, adhesivos esparcidores, espesantes de pulverización, agentes espumantes, activadores, detergentes y agentes reductores de la deriva) combinados con este producto pueden dañar el tejido foliar del césped. No se recomienda utilizar adyuvantes en combinación con el Herbicida de bajo olor Trimec 1000 contra malezas de hoja ancha, si la decoloración o los efectos cosméticos son objetables o inaceptables. No utilice adyuvantes ni combinaciones de aditivos en aerosol y mezclas en tanque, a menos que su experiencia indique que la mezcla en tanque no dañará el césped. Cuando se utiliza un adyuvante con este producto, PBI/Gordon Corporation recomienda el uso de un adyuvante certificado por la Asociación de Productores y Distribuidores de Productos Químicos (CPDA, por sus siglas en inglés).

**4. Equipo terrestre**

**Distribución del pulverizado:** La precisión y uniformidad de la distribución del herbicida es responsabilidad exclusiva de quien lo aplica. Para las aplicaciones al voleo y los tratamientos por zonas se pueden utilizar pulverizadores eléctricos equipados con una barra o una lanza/pistola pulverizadora. Los pulverizadores de barra equipados con boquillas, puntas y tamices apropiados son adecuados para las aplicaciones al voleo. Para obtener una mejor distribución y cobertura del pulverizado, seleccione un volumen de pulverización y sistema de distribución que aseguren la cobertura exacta y uniforme.

Los volúmenes de pulverización de 5 a 220 galones por acre con presiones de pulverización ajustadas de 20 a 40 psi. Nota: Para volúmenes de pulverización en bentgrass (*Agrostis*) (excepto greens de golf), utilice de 145 a 220 galones por acre. Aplique volúmenes más altos de pulverización para poblaciones de malezas más densas (hasta 220 galones por acre o 5 galones por 1,000 pies cuadrados).

- La calibración y la aplicación correcta son esenciales cuando se utiliza este producto.
- La aplicación excesiva o en cantidades superiores a las especificadas en esta etiqueta puede causar daños en el césped.

- **Técnica manual:** Se pueden utilizar varillas equipadas con puntas de boquilla de abanico plano con la técnica adecuada. Las boquillas de abanico plano no deben agitarse con un movimiento de vaivén, ni de lado a lado, ni con un movimiento de brazo oscilante. En cambio, se debe mantener a boquilla fija a la altura adecuada. El movimiento de lado a lado da como resultado una cobertura desigual.

Los pulverizadores manuales incluidos los modelos de mochila, y a presión son adecuados para zonas de césped pequeñas.

Después de usar este producto, limpie el pulverizador con jabón o detergente y agua, o un limpiador de tanque de pulverización aprobado, y enjuague completamente antes de aplicar otros pesticidas

## 5. Dónde usar el producto

Este producto proporciona un control selectivo de las malezas de hoja ancha en los siguientes lugares.

### • Lugares de césped ornamental:

- **Los lugares residenciales y domésticos** se definen como zonas asociadas con la familia o vida de familia incluidos, pero sin estar limitados a: complejos de apartamentos, condominios e instalaciones de atención de pacientes de casas de ancianos, instituciones psiquiátricas, hospitales u hogares de convalecencia.
- **Los lugares ornamentales** incluyen el césped establecido alrededor de residencias, parques, calles, establecimientos minoristas, cementerios, edificios industriales e institucionales, zonas de recreo, recintos de ferias, zonas adyacentes a campos de atletismo y zonas pavimentadas.
- **Los lugares institucionales** se definen como zonas de césped alrededor de edificios o instalaciones que prestan servicio a organizaciones públicas o privadas incluidos, pero sin estar limitados a: hospitales, casas de ancianos, escuelas, museos, bibliotecas, instalaciones deportivas, campos de golf (calles y rough) y edificios de oficinas.
- **Lugares no agrícolas:** incluidos corrales, cercados o líneas de vallado, derechos de paso de carreteras (principales, interestatales, comarcales, privadas y caminos sin asfaltar): Cunetas, zanjas, arcnos, terraplenes, separadores y medianas; zonas industriales: Aserraderos, parques de tanques, zonas de almacenamiento de combustible o equipos; terrenos municipales, estatales y federales: Aeropuertos e instalaciones militares; derechos de paso de ferrocarriles, estaciones de ferrocarril, cruces de vías férreas y estribos de puentes de ferrocarril; derechos de paso de servicios públicos: líneas telefónicas, oleoductos, tendidos eléctricos y líneas de transmisión de comunicaciones.
- **Lugares agrícolas:** Producción comercial de césped

### Prohibiciones de lugares:

- No aplique el producto a ninguna extensión de agua, como por ejemplo, lagos, riachuelos, ríos, lagunas, embalses o estuarios (bahías de agua salada). No aplique el producto a ninguna línea costera (terrenos no agrícolas adyacentes a la orilla de una extensión de agua) de lagos, riachuelos, ríos, lagunas, embalses o estuarios (bahías de agua salada).
- No aplique el producto a terrenos pantanosos (fangales, turberas, baches o pantanos).
- No aplique el producto a aguas de irrigación agrícola o sobre zanjas y canales de irrigación agrícola.
- No aplique el producto a aguas de drenaje agrícola o sobre zanjas agrícolas.
- No lo aplique en lugares que se utilicen para la producción comercial de madera o semillas, ni en otras plantas que se cultiven para la venta u otro uso comercial.
- No aplique ni permita que este producto entre en contacto directo con algodón, uvas, tabaco, cultivos de hortalizas, flores, árboles frutales u ornamentales u otras plantas de hoja ancha deseables; pequeñas cantidades de deriva de la pulverización pueden dañar plantas susceptibles, incluidos árboles o arbustos ornamentales.

### Tolerancia del césped:

- La tolerancia del césped a este producto puede variar, y además es posible que ocurra un amarillamiento temporal del césped. Las condiciones ambientales adversas pueden reducir la selectividad en el césped. No aplique este producto a céspedes estresados.
- Ciertos aditivos en el tanque del pulverizador (por ejemplo, adyuvantes, agentes humectantes, agentes tensioactivos), fertilizantes líquidos y mezclas de tanque que contienen otros concentrados emulsificables pueden reducir la selectividad en el césped. No utilice adyuvantes ni combinaciones de aditivos en aerosol y mezclas en tanque, a menos que su experiencia indique que la mezcla en tanque no dañará el césped. Cuando se utiliza un adyuvante con este producto, PBI/Gordon Corporation recomienda el uso de un adyuvante certificado por la Asociación de Productores y Distribuidores de Productos Químicos (CPDA, por sus siglas en inglés).

### Prohibiciones:

- No aplique este producto a St. Augustinegrass (*Stenotaphrum secundatum*), greens de bentgrass, carpetgrass (*Axonopus affinis*), dichondra (*Dichondra repens*), leguminosas y prados donde haya tréboles deseables presentes.
- No aplique este producto al voleo cuando las temperaturas estén por encima de los 90°F; se puede esperar algún daño con tratamientos puntuales cuando las temperaturas del aire exceden los 90°F. En los lugares donde los gobiernos estatales, del condado o locales tienen regulaciones de temperatura más estrictas, estas regulaciones deben ser observadas.

- Para evitar daños en el césped, utilícelo solo en céspedes que estén razonablemente libres de estrés por enfermedades, insectos, exceso de calor o frío, sequía o exceso de lluvia o riego, zonas de sombra, nematodos, siega inadecuada o aplicaciones inadecuadas de fertilizantes y pesticidas. Pueden producirse lesiones si este producto se aplica en cualquiera de estas u otras condiciones de estrés. Bajo cualquiera de estas condiciones de estrés, cualquier daño al césped causado por el uso de este producto está fuera del control del registrante y todo el riesgo es asumido por el comprador o usuario.
- Solo para aplicación terrestre; no se permiten las aplicaciones aéreas.
- No utilice este producto sobre o cerca de plantas deseables, incluido el contacto de la pulverización con sistemas radiculares expuestos o brotes adventicios dentro de la línea de goteo de árboles y arbustos deseables, ya que pueden producirse lesiones.

### RESTRICCIONES ESTATALES:

- **California, Oregón, Washington:** El uso de este producto en determinadas zonas de California, Oregón y Washington está sujeto a la Orden de 22 de enero de 2004 de medidas cautelares en el caso Washington Toxics Coalition, et.al. v. EPA, C01-0132C, (W.D. WA). Para obtener más información, consulte el sitio web de la EPA: <http://www.epa.gov/espplitstatus/wtc/qs-as.htm>.

## 6. Calendario de aplicaciones

Aplique este producto a las malas hierbas de hoja ancha jóvenes y en crecimiento activo para obtener los mejores resultados. Las aplicaciones otoñales pueden mejorar el control de las plantas anuales y perennes de invierno emergentes, como el cochinillo, la pamplina, el trébol y la hiedra terrestre.

### Para las zonas residenciales o domésticas, las zonas de césped ornamental, las zonas institucionales y las zonas agrícolas:

No aplique más de dos (2) tratamientos al voleo de este producto por sitio y año. Se aconseja una segunda aplicación al voleo o una aplicación de seguimiento como tratamiento puntual para malas hierbas más maduras, para infestaciones densas y para condiciones ambientales adversas.

Los tratamientos puntuales durante el verano pueden ser adecuados para infestaciones dispersas, o como tratamiento de seguimiento, o en cualquier momento en que las malas hierbas de hoja ancha estén creciendo activamente.

### Para los terrenos no agrícolas incluidos en la lista:

Utilice solo dos tratamientos al voleo para las malas hierbas anuales y perennes. Es necesario esperar 30 días entre tratamientos y, en caso necesario, se puede sustituir el segundo tratamiento al voleo por un tratamiento localizado.

Las condiciones ambientales extremas, como la temperatura y la humedad, las condiciones del suelo y las prácticas culturales, pueden afectar a la actividad de este producto. En condiciones de humedad cálida, los síntomas del herbicida pueden acelerarse. Mientras que en condiciones muy secas, la expresión de los síntomas del herbicida se retrasa, y las malas hierbas endurecidas por la sequía son menos susceptibles a este producto.

### Para zonas recién sembradas:

Retrasar la aplicación de este producto a las plántulas de césped hasta después de la segunda siega.

### Para zonas recién sembradas, esparcidas o taponadas:

La aplicación de este producto a céspedes recién sembrados, esparcidos o taponados debe retrasarse hasta 3 o 4 semanas después de las operaciones de sembrado, esparcido o taponado.

### Intervalo de resiembra:

Las zonas tratadas pueden volver a sembrarse 3 semanas después de la aplicación.

## 7. Cuánto utilizar

### TASAS DE UTILIZACIÓN Y VOLÚMENES DE PULVERIZACIÓN:

En general, las dosis de aplicación más bajas dentro del intervalo especificado proporcionarán un control satisfactorio de las especies de malas hierbas sensibles. Las dosis de aplicación más altas dentro del intervalo especificado serán necesarias para infestaciones densas de malas hierbas perennes, para condiciones ambientales adversas o extremas o para malas hierbas endurecidas o más maduras.

TABLA 1. Dosis de uso para céspedes ornamentales, tierras no agrícolas y cultivos de tepes.		
Especies	Tasa	Volumen de pulverización
<b>CÉSPED DE CLIMA FRÍO</b>		
<b>Bluegrass de Kentucky, annual bluegrass, annual ryegrass, perennial ryegrass, festuca alta, festucas rojas o de hoja fina.</b>	3.0 a 4 pintas/acre (1.1 a 1.5 onzas líquidas/1,000 pies cuadrados)	5 a 220 galones/acre (0.125 a 5.0 galones/1,000 pies cuadrados)
<b>Creeping Bentgrass</b> (excepto greens de golf) Aplicar preferentemente en mayo o a mediados de agosto hasta septiembre. El ligero color amarillento del césped desaparecerá al cabo de una (1) semana. Nota: Debe tenerse cuidado para evitar una sobredosificación de bentgrass o pueden producirse lesiones.	1.8 pintas/acre (0.66 onzas líquidas/1,000 pies cuadrados)	145 a 220 galones/acre (3.33 a 5.0 galones/1,000 onzas líquidas) Los volúmenes de pulverización elevados proporcionarán una cobertura uniforme.
<b>CÉSPED DE CLIMA CÁLIDO</b>		
<b>Bermudagrass híbrido, bermudagrass común, zoysiagrass, buffalograss y bahiagrass.</b> El ligero color amarillento del césped desaparecerá al cabo de una (1) semana.	3.0 a 4 pintas/acre (1.1 a 1.5 onzas líquidas/1,000 pies cuadrados) Granjeras de césped: 2 a 2.25 pintas/acre (0.75 a 0.83 onzas líquidas/1,000 pies cuadrados)	5 a 220 galones/acre (0.125 a 5.0 galones/1,000 pies cuadrados)
<p><b>Nota:</b> No aplicar en los céspedes de temporada cálida arriba indicados a menos que se pueda tolerar algún daño en el césped. Es imposible probar todas las condiciones ambientales para los céspedes de temporada cálida enumerados.</p> <p>No aplique este producto a céspedes de estaciones cálidas durante el reverdecer primaveral o en otoño durante el período de transición entre el crecimiento activo y el letargo.</p> <p><b>Césped inactivo:</b> Este producto puede aplicarse a bermudagrass totalmente latente, Zoysiagrass totalmente latente, buffalograss totalmente latente y bahiagrass totalmente latente.</p>		

### TRATAMIENTO LOCALIZADO:

#### CON PULVERIZADORES MANUALES (INCLUIDOS LOS DE MOCHILA Y LOS DE BOMBA):

- Aplicar en cualquier momento en que las malas hierbas de hoja ancha que hayan emergido estén creciendo activamente.
- La calibración y la aplicación correcta son esenciales cuando se utiliza este producto.
- Las aplicaciones uniformes son esenciales cuando se utiliza este producto. La aplicación excesiva o en cantidades superiores a las especificadas en esta etiqueta, incluidos los solapamientos excesivos de este producto, puede causar daños en el césped.
- Técnicas manuales: Se pueden utilizar varillas equipadas con puntas de boquilla de abanico plano con la técnica adecuada. Las boquillas de abanico plano no deben agitarse con un movimiento de vaivén, ni de lado a lado, ni con un movimiento de brazo oscilante. En cambio, se debe mantener a boquilla fija a la altura adecuada. El movimiento de lado a lado da como resultado una cobertura desigual.
- Las aplicaciones de seguimiento como tratamientos puntuales con un intervalo de 30 días son adecuadas para malas hierbas más maduras, para infestaciones densas y para condiciones ambientales adversas.
- **Limitaciones de los tratamientos puntuales en céspedes residenciales:** El tratamiento puntual se define como un área de tratamiento no superior a 1,000 pies cuadrados por acre. La dosis máxima de aplicación es de 1.5 onzas líquidas por 1,000 pies cuadrados por aplicación. El número máximo de tratamientos puntuales está limitado a 2 al año con un mínimo de 30 días entre aplicaciones.
- **Para los céspedes de estación fría (excepto Bentgrass) enumerados en la Tabla 1:** Mezcle de 1.1 a 1.5 onzas líquidas de este producto por un (1.0) galón de agua para el tratamiento de aproximadamente 1,000 pies cuadrados de césped. Aplique cada vez que las malezas de hoja ancha que hayan surgido sean susceptibles.
- **Para Bentgrass (excepto greens de golf):** Mezcle de 0.66 onzas líquidas de este producto por un (4.0) galón de agua para el tratamiento de aproximadamente 1,000 pies cuadrados de césped. Este alto volumen de pulverización elevados proporcionarán una cobertura uniforme. Aplique cada vez que las malezas de hoja ancha que hayan surgido sean susceptibles.
- **Para los céspedes de estación cálida (excepto Bentgrass) enumerados en la Tabla 1:** Mezcle de 0.75 a 0.83 onzas líquidas de este producto por un (1.0) galón de agua para el tratamiento de aproximadamente 1,000 pies cuadrados de césped. Aplique cada vez que las malezas de hoja ancha que hayan surgido sean susceptibles.

### CONSEJOS CULTURALES:

#### Riego:

- No aplique este producto a través de ningún tipo de sistema de riego.
- Es resistente a la lluvia en tan solo 8 horas. No aplique este producto inmediatamente antes de la lluvia o el riego.
- Si es posible, no riegue el césped entre 8 y 24 horas después de la aplicación.
- Si existen condiciones secas, se recomienda un riego programado o regar 24 horas antes y 24 horas después de la aplicación.

#### Siega:

Para obtener resultados óptimos, retrasar la siega 2 días antes y hasta 2 días después de la aplicación de este producto.

TABLA 2. Restricciones a las aplicaciones al voleo en céspedes ornamentales, cultivos de tepes y tierras no agrícolas.				
Uso del lugar	Cantidad máxima por aplicación	Número máximo de aplicaciones por año	Intervalo mínimo entre aplicaciones	Cantidad máxima estacional
Céspedes ornamentales	4.0 pintas/A (1.19 lb. 2,4-D ae/A) (0.33 lb. MCP-P ae/A) (0.11 lb. dicamba ae/A)	2	30 días	8.0 pintas/A (2.37 lb. 2,4-D ae/A) (0.65 lb. MCP-P ae/A) (0.22 lb. dicamba ae/A)
Granjas de césped	4.0 pintas/A (1.19 lb. 2,4-D ae/A) (0.33 lb. MCP-P ae/A) (0.11 lb. dicamba ae/A)	2	30 días	8.0 pintas/A (2.37 lb. 2,4-D ae/A) (0.65 lb. MCP-P ae/A) (0.22 lb. dicamba ae/A)
Terrenos no agrícolas	4.0 pintas/A (1.19 lb. 2,4-D ae/A) (0.33 lb. MCP-P ae/A) (0.11 lb. dicamba ae/A)	2 (malas hierbas anuales y perennes)	30 días	8.0 pintas/A (2.37 lb. 2,4-D ae/A) (0.65 lb. MCP-P ae/A) (0.22 lb. dicamba ae/A)

### 8. Malezas de hoja ancha controladas

El Herbicida de bajo olor Trimec 1000 contra malezas de hoja ancha controlará las siguientes malas hierbas de hoja ancha. Aplique cada vez que las malezas de hoja ancha que hayan surgido sean susceptibles.

#### MALEZA DE HOJA ANCHA

escobilla morisca	hinojo canino	lespedeza, común	bolsa de pastor
áster, brezo blanco y trébol blanco	geranio pie de paloma	malva, común	tártago moteado
galio	falso diente de león (*gatsear manchado y gatsear común)	hierba de San Nicolás	euphorbia
cañamo acuático	enredadera del campo (*morningglory y creeping jenny)	pamplina ratonera	girasol
cadillo juancho, rastrero	sherardia	mostaza	cardo
correhuela	margarita del campo (*creeping oxeye)	ortiga	hoja terciopelo (*diodia virginiana)
cuernecillo	berro de campo	flor de diamante del viejo mundo	Malva de Venecia
mielga azafranada	flores de Bach, tallo blanco y tallo rojo	<i>Oxalis</i> (*acedera amarilla y acedera rastrera)	<i>Veronica</i> (*Veronica arvensis)
llantén mayor	Pusley Florida	perejil-piert	Botón de Virginia**
llantén menor	hiedra terrestre	Persicaria pensylvanica	Enredadera de Virginia
cardo borriquero	groundsel	centella asiática (*Hydrocotyle umbellata)	salsifí occidental
carretón de amores	berro peludo	hierba de la pimienta	trébol blanco (*trébol holandés, trébol madre selva, trébol blanco y hierba púrpura)
bardana menor	espiguilla	cochinilla	zanahoria silvestre
geranio de Carolina	consuelda menor	matricaria discoidea	ajo silvestre
anisillo	henbit	plátano	geranio silvestre
hierba de los canarios	ortiga de Carolina	roble venenoso	lechuga silvestre
achicoria	erigeron de Canadá	centidonia postrada (*centidonia)	mostaza silvestre
cincoenrama leñosa	Collinsia verna (Mary de ojos azules)	abrojo	cebolla silvestre
trébol	estramonio	cudweed púrpura	fresa silvestre
cardos	kochia	verdolaga	milenrama
planta brújula	centidonia	ambrosia	cohete amarillo
dársena rizada	cenizo	hierba carmín	
diente de león	soliva	acedera roja (*acedera ovina)	
flor de día		cozolmecatl	
ortiga			
lengua de vaca			

\*Sinónimos

\*\* Puede ser necesario repetir la solicitud en 30 días

**ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN**

No contaminar el agua, los alimentos o los piensos mediante el almacenamiento y la eliminación.

**ALMACENAMIENTO DE PESTICIDAS:** Almacenar en el envase original en un lugar cerrado e inaccesible a niños o animales domésticos. Evitar que se congele.

**ELIMINACIÓN DE PESTICIDAS:** Los residuos de pesticidas son muy peligrosos. La eliminación inadecuada del exceso de pesticida, de la mezcla de pulverización o del agua de enjuague constituye una infracción de la legislación federal. Si estos residuos no pueden eliminarse siguiendo las instrucciones de la etiqueta, póngase en contacto con la Agencia Estatal de Control de Pesticidas o Medioambiental, o con el Representante de Residuos Peligrosos de la Oficina Regional de la EPA más cercana para que le orienten.

**Para contenedores no rellenables de menos o igual a 5 galones:**

**MANIPULACIÓN DEL RECIPIENTE:** Envase no reutilizable No reutilice ni rellene este recipiente. Ofrézcalo para reciclaje, si está disponible, o perforélo y elimínelo en un vertedero sanitario, o por incineración, o, si lo permiten las autoridades estatales y locales, quémelo. Si lo quema, manténgase alejado del humo.

Aplice un triple enjuague o enjuague a presión el recipiente (o equivalente) inmediatamente después de vaciarlo.

Aplice un triple enjuague de la siguiente manera: Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla y vacíe durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Llene el recipiente 1/4 de su capacidad con agua y vuelva a taponarlo. Agite durante 10 segundos. Vierta el agua de enjuague en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla o almacene el agua de enjuague para su uso o eliminación posterior. Deje escurrir durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Repita este procedimiento dos veces más.

O

Enjuague a presión de la siguiente manera: Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla y continúe drenando durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Mantenga el recipiente boca abajo sobre el equipo de aplicación o el tanque de mezcla o recoja el enjuague para su uso o eliminación posterior. Inserte la boquilla de enjuague a presión en el lateral del recipiente y enjuague a aproximadamente 40 PSI durante al menos 30 segundos. Deje escurrir durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear.

**Para recipientes no reutilizables de más de 5 galones:**

**MANIPULACIÓN DEL RECIPIENTE:** Envase no reutilizable No reutilice ni rellene este recipiente. Ofrézcalo para reciclaje, si está disponible, o perforélo y elimínelo en un vertedero sanitario, o mediante incineración, o, si lo permiten las autoridades estatales y locales, quemándolo Si lo quema, manténgase alejado del humo quemado, manténgase alejado del humo.

Aplice un triple enjuague o enjuague a presión el recipiente (o equivalente) inmediatamente después de vaciarlo.

Aplice un triple enjuague de la siguiente manera: Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla. Llene el recipiente 1/4 de su capacidad con agua. Vuelva a colocar y apriete los cierres. Inclínelo el recipiente sobre un lado y hágallo rodar hacia delante y hacia atrás, asegurándose de que da al menos una vuelta completa, durante 30 segundos. Coloque el recipiente sobre su extremo e inclínelo hacia delante y hacia atrás varias veces. Gire el recipiente sobre su otro extremo e inclínelo hacia delante y hacia atrás varias veces. Vacíe el enjuague en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla o almacene el enjuague para su uso o eliminación posterior. Repita este procedimiento dos veces más.

O

Enjuague a presión de la siguiente manera: Vacíe el contenido restante en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla y continúe drenando durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear. Mantenga el recipiente boca abajo sobre el equipo de aplicación o el tanque de mezcla o recoja el enjuague para su uso o eliminación posterior. Inserte la boquilla de enjuague a presión en el lateral del recipiente y enjuague a aproximadamente 40 PSI durante al menos 30 segundos. Deje escurrir durante 10 segundos después de que el flujo comience a gotear.

**Para envases reutilizables:**

**MANIPULACIÓN DEL RECIPIENTE:** Recipiente reutilizable. Rellene este recipiente solo con pesticida. No reutilice este recipiente para ningún otro fin.

Limpieza de recipientes: La limpieza del recipiente antes de su eliminación final es responsabilidad de la persona que se deshace de él. La limpieza previa al rellenado es responsabilidad del rellenador.

Para limpiar el recipiente antes de su eliminación final, vacíe el contenido restante de este recipiente en el equipo de aplicación o en un tanque de mezcla. Llene el recipiente con agua hasta un 10 % aproximadamente. Agite enérgicamente o haga recircular el agua con la bomba durante 2 minutos. Vierta o bombee el agua de enjuague en el equipo de aplicación o en el sistema de recogida de agua de enjuague. Repita este procedimiento de aclarado dos veces más.

**GARANTÍA LIMITADA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD**

**IMPORTANTE:** Lea esta GARANTÍA LIMITADA Y RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD antes de comprar o utilizar este producto. Al abrir y utilizar este producto, el comprador y todos los usuarios aceptan los términos de esta GARANTÍA LIMITADA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD en su totalidad y sin excepciones. Si las condiciones no son aceptables, devuelva este producto sin abrir inmediatamente al punto de compra y se le reembolsará íntegramente el precio de compra.

Es imposible eliminar todos los riesgos inherentes al uso de este producto. Pueden producirse daños en el artículo tratado, ineficacia u otras consecuencias no deseadas como consecuencia del uso del producto en condiciones anormales, como el clima, la presencia de otros materiales o la forma de uso o aplicación, etc. Dichos factores y condiciones están fuera del control del fabricante, y **AL COMPRAR Y UTILIZAR ESTE PRODUCTO, EL COMPRADOR Y TODOS LOS USUARIOS DEL MISMO ACEPTAN TODOS ESTOS RIESGOS.**

El comprador y todos los usuarios aceptan además asumir todos los riesgos de pérdida o daño derivados del uso del producto de cualquier forma que no esté explícitamente establecida en las instrucciones, advertencias y precauciones de la etiqueta o que sea incompatible con ellas.

El fabricante garantiza únicamente que este producto se ajusta a la descripción química que figura en la etiqueta, y que el producto es razonablemente adecuado para el uso indicado en la etiqueta cuando se aplica de acuerdo con las instrucciones de uso, sujeto a los riesgos inherentes que se describen a continuación. **EN LA MEDIDA EN QUE SEA COMPATIBLE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, EL FABRICANTE NO OFRECE NI PRETENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, QUE POR LA PRESENTE QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS.**

**EN LA MEDIDA EN QUE SEA COMPATIBLE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE, EL RECURSO EXCLUSIVO DEL COMPRADOR Y DE TODOS LOS USUARIOS DE ESTE PRODUCTO, Y LA RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL FABRICANTE, POR TODAS Y CADA UNA DE LAS PÉRDIDAS, DAÑOS O LESIONES RESULTANTES DEL USO O MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO, ESTÉN O NO BASADOS EN CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD OBJETIVA EXTRA CONTRACTUAL O DE OTRO TIPO, SE LIMITARÁN, A ELECCIÓN DEL FABRICANTE, A LA SUSTITUCIÓN O AL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA DE LA CANTIDAD DE PRODUCTO CON RESPECTO A LA CUAL SE RECLAMAN LOS DAÑOS. EN LA MEDIDA EN QUE SEA COMPATIBLE CON LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO EL FABRICANTE SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES O ESPECIALES RESULTANTES DEL USO O MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO.** El Fabricante debe ser notificado inmediatamente por escrito de cualquier reclamación, ya sea basada en contrato, responsabilidad extracontractual, negligencia, responsabilidad objetiva o de otro tipo, para tener derecho a recibir cualquiera de las soluciones indicadas anteriormente.

Los términos de esta GARANTÍA LIMITADA Y EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD no pueden modificarse mediante declaraciones ni acuerdos escritos ni verbales en el punto de venta o en cualquier otro lugar. Ningún empleado ni agente del fabricante ni vendedor está autorizado a variar o exceder los términos de esta Garantía Limitada y Descargo de Responsabilidad de ninguna manera.

ATENCIÓN: Este producto contiene una sustancia química que el estado de California considera cancerígena.

994/11-2023 AP052113  
EPA REG. NO. 2217-931



Employee-Owned

MANUFACTURED BY  
PBI/GORDON CORPORATION  
P.O. BOX 860350  
SHAWNEE, KANSAS 66286  
PBIgordonTurf.com

ATENCIÓN: Esta etiqueta de espécimen se proporciona únicamente para uso informativo. Este producto puede no estar disponible aún para su venta en su estado o área. La información que aparece en esta etiqueta puede diferir de la que aparece en la etiqueta del producto que está utilizando. Siga siempre las instrucciones de uso y las precauciones que figuran en la etiqueta del producto que está utilizando.